

**RENATHA CONCEPCION
BARREDO ROBLED0**

**3ER SEMESTRE
MEDICINA HUMANA**

**DRA. ANEL GUADALUPE
GORDILLO ABADIA**

MÁS DEL 10% DE LOS NIÑOS HAN ESTADO EXPUESTOS A ALTOS NIVELES DE ALCOHOL DURANTE SU EMBARAZO DE SU MAMA.

EL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE EL EMBARAZO PUEDE OCASIONAR LOS MISMOS RIESGOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN GENERAL. PERO GENERA RIESGOS ADICIONALES PARA EL FETO. CUANDO UNA MUJER EMBARAZADA TOMA ALCOHOL, ÉSTE ATRAVIESA FÁCILMENTE LA PLACENTA HACIA EL FETO. DEBIDO A ESTO, EL CONSUMO DE ALCOHOL LE PUEDE CAUSAR DAÑO AL DESARROLLO DEL BEBÉ.

NO SE HA ESTABLECIDO NINGÚN NIVEL "SEGURO" CON EL CONSUMO DE ESTA BEBIDA DURANTE EL EMBARAZO. LAS CANTIDADES MAYORES DE ALCOHOL PARECEN INCREMENTAR LOS PROBLEMAS. EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES MÁS DAÑINO QUE TOMAR PEQUEÑAS CANTIDADES DE ESTA BEBIDA.

EL MOMENTO DEL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE EL EMBARAZO TAMBIÉN ES IMPORTANTE. BEBER ALCOHOL PROBABLEMENTE ES MÁS DAÑINO DURANTE LOS PRIMEROS 3 MESES DE EMBARAZO. SIN EMBARGO, TOMAR ALCOHOL EN CUALQUIER MOMENTO DE LA GESTACIÓN PUEDE SER DAÑINO.

características craneofaciales del Síndrome Alcohólico Fetal



Facies en Síndrome Alcohólico Fetal



En el Niño Pequeño

Strassburg, 1994



SINDROME DE ALCOHOLISMO FETAL

CONJUNTO DE PROBLEMAS FÍSICOS, MENTALES Y DE CRECIMIENTO QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN UN BEBÉ CUANDO LA MADRE TOMA ALCOHOL DURANTE EL EMBARAZO

AFECCIÓN DEL NIÑO QUE SE DERIVA DE LA EXPOSICIÓN AL ALCOHOL DURANTE EL EMBARAZO DE LA MADRE

PROBLEMAS

PRUEBAS Y EXAMENES



DEFECTOS FÍSICOS

CAUSAS


PRONOSTICO

La exposición al alcohol durante el embarazo puede provocar FASD al interferir en el desarrollo del cerebro del bebé y de otros órganos y funciones fisiológicas críticas.

- Rasgos faciales característicos, entre ellos, ojos pequeños, el labio superior excepcionalmente delgado, nariz corta y hacia arriba, y superficie de la piel lisa entre la nariz y el labio superior
- Crecimiento físico lento, antes y después del nacimiento
- Perímetro de la cabeza y tamaño del cerebro pequeño

El pronóstico para los bebés con SAF varía. Casi ninguno de ellos tiene desarrollo cerebral normal. Los bebés y niños con SAF tienen muchos problemas diferentes que pueden ser difíciles de manejar.






• Crecimiento deficiente mientras el bebé está en el útero y después de nacer.



• Disminución del tono muscular y mala coordinación.



SINDROME DE ALCOHOLISMO FETAL

SINTOMAS



• Imperactividad



• Problemas de visión, como la vista de cerca (miopía)



LINKOGRAFIA:

- <https://www.msdmanuals.com/es/professional/pediatría/trastornos-metabólicos-electrolíticos-y-tóxicos-en-recién-nacidos/síndrome-alcohólico-fetal?ruleredirectid=757>
- <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2010/v108n1a11.pdf>