



**Nombre Del Alumno: José Manuel Arriaga  
Nanduca**

**Nombre Del Docente: Dra Anel Guadalupe  
Abadia Gordillo**

**Asignatura: Sexualidad Humana**

**Semestre: 3ro**

**Institución: UDS**

**Fecha de entrega: 12/10/2024**

# SIFILIS

La sífilis es una enfermedad crónica que puede afectar a diferentes órganos del cuerpo.

## SINTOMAS

### Etapa Primaria:

- Chancro
- Ganglios linfáticos inflamados

### Etapa Secundaria:

- Erupciones cutáneas
- Fiebre
- Cefalea

### Etapa latente:

- Problemas cardíacos
- Daño cerebral
- Ceguera



## INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

### ¿QUE ES?

Una infección de transmisión sexual (ITS) o enfermedad venérea, es una afección clínica infectocontagiosa que se transmite de persona a persona por medio del contacto sexual que se produce durante las relaciones sexuales.



## prevención




Uso de condón



Vacunas



pruebas regulares



# VIH

## FACTORES DE RIESGO



## MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH

### ¿QUE ES?

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Daña su sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones.



### TRANSMISION

- Relaciones sexuales (vaginal, oral, anal)
- Consumo de drogas (inyectadas)
- Contacto con la sangre infectada por VIH




Vía sexual



Vía sanguínea



Vía materna



- Consumir de alcohol o drogas antes del sexo.
- No usar un método de prevención del VIH durante las relaciones sexuales.
- Tener relaciones sexuales con múltiples parejas.
- Tener relaciones sexuales entre hombres.
- El sexo anal es el tipo de sexo más riesgoso para contraer o transmitir el VIH.
- Compartir agujas, jeringas u otros elementos de inyección de drogas.

### SINTOMAS

- Fiebre
- Escalofríos
- Sarpullido
- Diaforesis
- Mialgias
- Dolor de garganta
- Fatiga
- Ganglios linfáticos inflamados
- Llagas en la boca

- **Teniendo abstinencia sexual (no teniendo relaciones sexuales).**



- **Mediante la práctica del sexo seguro, es decir, sin penetración (besos, caricias, abrazos autoerotismo o masturbación).**



- **Utilizando guantes de látex o poliuretano siempre que se maneje sangre o secreciones corporales.**




- **Ofreciendo medicamentos antirretrovirales gratuitos a todas las embarazadas con VIH.**

# HEPATITIS B Y C

La hepatitis B es una infección hepática grave causada por el virus de la hepatitis B (VHB).


## RIESGOS

- Insuficiencia cardíaca
- Cáncer de hígado
- cirrosis hepática



## SINTOMAS

- Dolor abdominal
- Orina oscura
- Fiebre
- Dolor en las articulaciones
- Pérdida del apetito
- Náuseas y vómitos
- Debilidad y fatiga



## CAUSAS

### ✓ Contacto sexual:

Puedes contraer hepatitis B si tienes relaciones sexuales sin protección con una persona infectada.

### ✓ Compartir agujas:

El virus de la hepatitis B se transmite fácilmente a través de agujas y jeringas contaminadas con sangre infectada.

### ✓ De madre a hijo:

Las mujeres embarazadas infectadas por el virus de la hepatitis B pueden transmitirlo a sus bebés durante el trabajo de parto.

# PREVENCION

Uso de aplicación de la vacuna contra la hepatitis B, especialmente en:

- ✓ Recién nacidos
- ✓ Niños y adolescentes
- ✓ Personas que viven con alguien que tenga hepatitis B
- ✓ Personas con enfermedad hepática crónica



# Síntomas

- Micción dolorosa
- Secreción vaginal
- Secreción proveniente del pene
- Relaciones sexuales vaginales dolorosas
- Sangrado vaginal menstruales y después de las relaciones sexuales
- Dolor testicular



# Chlamydia trachomatis

Son enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian principalmente por contacto con genitales o líquidos corporales.



# Factores de riesgo

- Las personas que tienen relaciones sexuales antes de los 25 años presentan un riesgo más alto para clamidia que las personas mayores.
- No utilizar preservativo o utilizarlo de manera incorrecta.
- Tener parejas sexuales nuevas o múltiples.



# Complicaciones

- Enfermedad inflamatoria pélvica.
- Infección cerca de los testículos.
- Infección de la glándula prostática.
- Embarazo ectópico.
- Infertilidad.
- Artritis reactiva.

# Prevencion

- Utilizar preservativos.
- Limitar la cantidad de parejas sexuales.




## SINTOMAS

### Hombres:

- Micción dolorosa
- Secreción de pus en el pene
- Dolor y hinchazón en el testículo

### Mujer:

- Aumento del flujo vaginal
- Micción dolorosa
- Sangrado vaginal
- Dolor pélvico




## CAUSAS

Siempre va ocurrir de transmisión de persona a persona durante el contacto sexual, que incluye el sexo oral, anal, vaginal.



## FACTOR DE RIESGO

- Mujeres sexualmente activas menores de 25 años
- Los hombres tienen relaciones sexuales con hombres corren un mayor riesgo de contraer gonorrea.



# Gonorrea

La gonorrea es la enfermedad producida por la infección por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*. Infecta típicamente los epitelios de la uretra, el cuello uterino, el recto, la faringe o las conjuntivas y causa irritación o dolor y secreción purulenta.





¡ PROTEGETE !



## COMPLICACIONES

- Infertilidad en mujeres.
- Infertilidad en los hombres.
- Infección que se disemina a las articulaciones y otras áreas del cuerpo.
- Mayor riesgo de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
- Complicaciones en los bebés.




## PREVENCIÓN

- Utilizar preservativos si mantienes relaciones sexuales.
- Limitar la cantidad de parejas sexuales.
- Realizar exámenes de detección contra gonorrea con regularidad.




## FACTORES DE RIESGO



- Múltiples parejas sexuales.
- Antecedentes de ITS.
- Haber tenido tricomoniasis anteriormente.
- Relaciones sexuales sin preservativo.



**¡ ES IMPORTANTE ACUDIR AL MEDICO, SI LOGRAS PADECER ESTOS SINTOMAS !**



## TRICOMONIASIS

**La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual común provocada por un parásito.**

## SINTOMAS

- Enrojecimiento, ardor y picazón vaginal.
- Disuria.
- Dolor al tener relaciones sexuales.
- Enfermedad inflamatoria pélvica.
- Secreción purulenta del pene.

## PREVENCIÓN

Al igual que con otras infecciones de transmisión sexual, la única manera de prevenir la tricomoniasis es la abstinencia sexual. Utilizar un preservativo interior o exterior cada vez que tengas relaciones sexuales.



## CAUSAS

- Es causado por 2 tipos de virus de herpes simple.
- Ampollas y úlceras, o en el líquido de las úlceras.
- Recubrimiento húmedo o líquidos de la boca.




## FACTORES DE RIESGO

- Contacto con genitales a través de sexo oral, vaginal o anal.
- Tener relaciones sexuales con múltiples parejas.
- Tener una pareja que presenta la enfermedad, pero que no toma medicamentos para tratarla.



## PREVENCIÓN

- Usa un preservativo o una barrera bucal durante la actividad sexual.
- No tengas relaciones sexuales cuando una pareja con herpes genital presente síntomas.



# HERPES GENITAL

**El herpes genital es una infección de transmisión sexual común.**


**El herpes genital a menudo se propaga por contacto piel con piel durante las relaciones sexuales.**

## SINTOMAS

- Dolor o prurito en los genitales.
- Úlceras o ampollas que exudan o sangran.
- Micción dolorosa.
- Secreción en la uretra o vagina.


## COMPLICACIONES

- Enfermedad inflamatoria interna.
- Infección en los dedos de las manos.
- Infección ocular.
- Hinchazón del cerebro.
- Infección de los órganos internos.




## SINTOMAS

- Dolor.
- Prurito en los genitales.
- Sensibilidad en los genitales.
- Sabgrado.



## CUASAS

Las infecciones genitales por el Virus del papiloma humano se transmiten mediante las relaciones sexuales, el sexo anal y otros tipos de contacto de piel con piel en la región genital.



# VPH

La infección por el virus del papiloma humano causa verrugas e inclusive pueden causar diferentes tipos de cáncer.

## PREVENCION

- Estar en una relación sexual mutuamente monógama
- Reducir el número de parejas sexuales
- Usar un condón de látex, que puede reducir el riesgo de VPH.



## FACTORES DE RIESGO

- Cantidad de parejas sexuales.
- Edad.
- Sistemas inmunitarios debilitados.
- Piel dañada.
- Contacto personal.



## COMPLICACIONES

- Lesiones orales y de las vías respiratorias superiores.
- Cáncer.

