



UDSA

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Ariadna Vianney Escobar López

Nombre del tema: Infecciones de Transmisión Sexual

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Sexualidad Humana

Nombre del profesor: Anel Guadalupe Abadia Gordillo

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Semestre: 3ro

Medidas de prevención para ITS

1

1. Utilizar el preservativo.
2. Tener una buena educación sexual.
3. Reducir el número de parejas sexuales.
4. Mantener una higiene adecuada.
5. Evitar el consumo de alcohol y drogas
6. Abstinencia sexual
7. No compartir objetos sexuales
8. comunicación con la pareja
9. Vacunarse contra ITS
10. Realizarse pruebas de detección



¿Cuándo acudir al médico?

2

- Eres sexualmente activo y podrías haber estado expuesto a una infección de transmisión sexual.
- Tienes síntomas de una infección de transmisión sexual


Factores de riesgo

- Tener relaciones sexuales sin protección
- Tener contacto sexual con varias parejas
- Tener antecedentes de ITS
- Tener relaciones sexuales contra voluntad
- Abusar del alcohol o drogas ilícitas recreativas
- Drogas inyectables
- Ser muy joven
-



Ariadna

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL




Hepatitis B y C



La hepatitis B es una infección hepática grave causada por el virus de la hepatitis B (VHB), es de corta duración, se denomina aguda, y dura menos de seis meses

Síntomas

- Dolor abdominal
- Orina oscura
- Fiebre
- Dolor en las articulaciones
- Pérdida del apetito
- Náuseas y vómitos
- Debilidad y fatiga
- Ictericia



Hepatitis C es una infección vírica que causa la hinchazón del hígado, el virus de la hepatitis C (VHC) se propaga a través del contacto con sangre que contiene el virus

Síntomas

- Sangrado con facilidad.
- Tendencia a la formación de moretones.
- Cansancio.
- Negarse a comer.
- Ictericia
- Orina de color oscuro.
- Picazón en la piel.
- Ascitis.
- Hinchazón en las piernas.
- Pérdida de peso.
- encefalopatía hepática
- Vasos sanguíneos en forma de araña en la piel



Sífilis

La sífilis es una infección causada por bacteria (treponema pallidum), se transmite por contacto directo de persona a persona. La enfermedad comienza a hacerse presente con una llaga en los genitales, el recto o la boca, que no suele generar dolor



Síntomas

- Sífilis primaria: Aparición del chancro en los genitales, la boca, la piel o el recto, e inflamación de los ganglios linfáticos cercanos
- Sífilis secundaria: erupciones en la piel, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de peso, caída del cabello
- Sífilis latente: no hay síntomas, pero la bacteria sigue en el organismo
- Sífilis terciaria: lesiones graves en la piel, los huesos, los órganos internos, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso



VIH



Causada por el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, daña el sistema inmunitario, de modo que el organismo es menos capaz de combatir infecciones y enfermedades

Síntomas

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular y articular
- Sarpullido
- Dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca
- Ganglios linfáticos o nódulos inflamados, principalmente, en el cuello
- Diarrea
- Pérdida de peso
- Tos
- Sudoraciones nocturnas




Clamidia



La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria llamada Chlamydia trachomatis

Síntomas

- Flujo vaginal
- Sangrado vaginal.
- Dolor abdominal.
- Dolor durante el sexo.
- Ardor o dolor al orinar
- Salida de corrimiento purulento por la uretra.
- Hinchazón del escroto
- Dolor en los testículos
- Proctitis




Gonorrea



Causada por una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae, infecta a hombres y mujeres de forma similar, aunque los síntomas son menos evidentes en las mujeres

Síntomas

- Secreción purulenta (de aspecto lechoso o amarillento) por la uretra.
- Disuria (sensación de ardor o dolor al orinar).
- Urgencia de orinar.
- Inflamación en la punta del pene, en el orificio de la uretra



Tricomoniásis



Es causada por el protozoo Trichomonas vaginalis. Es la enfermedad sexualmente transmisible no viral más común en todo el mundo, afectando a unos 170 millones de personas

Síntomas

- En hombres es asintomático
- En mujeres: vaginitis, flujo amarillento verdoso de olor desagradable, disuria, dispareunia, prurito



Herpes genital



Es provocada por el virus herpes simplex, que se caracteriza por la aparición de pequeñas ampollas y úlceras dolorosas en la región genital

Síntomas

- Los síntomas del herpes genital tienden a desarrollarse dentro de 3-7 días después de la relación sexual responsable por la infección
- Pequeñas ampollas agrupadas en los órganos genitales, fiebre, dolor de cuerpo, prurito, disuria, llagas,



VPH



La infección por el virus del papiloma humano es una infección viral que comúnmente causa crecimientos en la piel o en las membranas mucosas (verrugas), algunos tipos de VPH causan cáncer

Síntomas

- Verrugas genitales
- Verrugas comunes
- Verrugas plantares
- Verrugas planas

Cáncer cervicouterino por VPH 16 Y VPH 18

