



## Mapa Conceptual

**Nombre del Alumno:** Clara Elisa Encino Vázquez

**Nombre del tema:** Tipos de otitis

**Parcial:** IV

**Nombre de la Materia:** Crecimiento y desarrollo

**Nombre del profesor:** Dra Sheyla Urbina

**Nombre de la Licenciatura:** Medicina Humana

Cuatrimestre-Semestre



# OTITIS

## Ototubaritis

## Otitis externa

## Otitis media aguda

### Etiología

Disfunción de la trompa de Eustaquio (infección viral, alergias)

Bacterias (P. aeruginosa, S. aureus)

Virus o bacterias (S. pneumoniae, H. influenzae)

### Factores de riesgo

Alergias, infecciones respiratorias

Humedad, traumatismos, uso de hisopos

Infecciones respiratorias, niños pequeños

### Clinica

Sensación de presión, autofonía, hipoacusia

Dolor, prurito, otorrea

Dolor, fiebre, hipoacusia, irritabilidad.

### Exploración

Membrana timpánica retraída, burbujas de aire.

Dolor al movilizar pabellón auricular

Membrana timpánica eritematosa, abombada

### Tratamiento

Descongestionantes, antihistamínicos, maniobras de Valsalva

Limpieza, gotas antibióticas y antiinflamatorias

Limpieza y antibióticos en casos graves



# OTITIS

## Otitis media serosa

## Otomicosis

## Miringitis bullosa

### Etiología

Acumulación de líquido no infeccioso

Hongos (Aspergillus, Candida)

Virus (gripe, varicela)

### Factores de riesgo

Disfunción tubárica, alergias, barotrauma.

Humedad, uso prolongado de gotas tópicas

Infecciones respiratorias virales

### Clinica

Hipoacusia, sensación de plenitud.

Prurito, otorrea blanca o negra

Dolor súbito, otorrea sanguinolenta

### Exploración

Líquido detrás de la membrana timpánica

Material micótico en conducto auditivo.

Ampollas en la membrana timpánica

### Tratamiento

Tx de seguimiento; tubos de drenaje en casos crónicos

Limpieza y antifúngicos tópicos

Analgésicos y manejo sintomático



# OTITIS

## Otitis externa maligna

## Otitis media crónica simple

## Colesteatoma

Etiología

P. aeruginosa

Infección recurrente

Crecimiento epitelial anómalo

Factores de riesgo

Diabetes, inmunosupresión

Perforación timpánica previa

Otitis media crónica, disfunción tubárica

Clinica

Dolor severo, fiebre, otorrea

Hipoacusia, otorrea persistente

Otorrea purulenta, hipoacusia

Exploración

Conducto inflamado, tejido necrótico

Perforación en membrana timpánica

Masa blanquecina visible en oído medio

Tratamiento

Antibióticos IV, cirugía en casos avanzados

Cirugía (timpanoplastia)

Cirugía (mastoidectomía)

<https://www.gaes.es/enfermedades-oido/infecciones-problemas-oido/otitis>