



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Asignatura: Clínicas quirúrgicas complementarias

Tema: Tipos de otitis

Docente: Sheila Anahí Urbina Hernández

Alumno: Yesica de Jesús Gómez López

7 Semestre

4 Semestre

TIPOS DE OTITIS CUADRO COMPARATIVO

	<i>Otitis media aguda</i>	<i>Otitis media serosa</i>	<i>Otomycosis</i>	<i>Miringitis</i>
Etiología	Viral o bacteriana	Otitis media aguda no se ha resuelto por completo o cuando una alergia provoca una obstrucción en la trompa de Eustaquio.	Producidas por hongos saprófitos oportunistas.	Infecciones virales
Factores de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Asistir a guarderías. • Cambios de altitud o de clima. • Clima frío. • Exposición al humo. • Antecedentes de infecciones del oído. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resfriados y Infecciones respiratorias frecuentes. • Reacciones alérgicas. • Disfunción tubárica. • Otitis medias agudas de repetición. • Alergias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Calor • Dermatitis seborreica • Cambios del pH • Uso de dispositivos auditivos • Limpieza agresiva de los oídos • Cambios ambientales 	Se desarrolla en paciente con otitis media viral, bacteriana
Clínico	<ul style="list-style-type: none"> • Niños > se quejan de otalgia • Lactantes se vuelven 	<ul style="list-style-type: none"> • No referir síntomas • Experimentar sensación de plenitud, presión 	<ul style="list-style-type: none"> • Prurito • Dolor • Descamación del epitelio • Hipoacusia 	<ul style="list-style-type: none"> • hipoacusia • Pérdida de audición temporal • Mareo

Exploración

irritables y tiran del oído afectado.

- Hiporexia, vómito, alteraciones del sueño y diarrea, y con frecuencia la fiebre alta.

La otoscopia muestra una membrana timpánica hiperémica engrosada clásica

o un ruido seco en el oído al tragar

La membrana timpánica, como el color ámbar o gris, el desplazamiento del reflejo luminoso, la retracción leve a intensa y sus marcas acentuadas.

- Picor
- Comezón del área
- Inflamación o hinchazón

- Exploración física con otoscopio y biomicroscopio
- Edema del epitelio
- Eritema y otorrea

- **Secreción del oído**

se explora el oído mediante otoscopio, para localizar la presencia de ampollas u otras lesiones del tímpano

Tratamiento

Analgésicos

Si es necesario, antibióticos.

Observación

Si no se resuelve, miringotomía con colocación de un tubo de timpanostomía

Por lo general en las gotas óticas adaptadas, los cuidados locales y las normas higienicodietéticas.

El tratamiento de la miringitis depende del tipo, pero en general supone tomar un antibiótico y un analgésico para aliviar el dolor.



Si es recurrente en
la niñez, a veces
adenoidectomía

bibliografía

<https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-otorrinolaringol%C3%B3gicos/trastornos-del-o%C3%ADdo-medio-y-la-membrana-timp%C3%A1nica/miringitis>

