



Cuadro Comparativo

Nombre del Alumno: Clara Elisa Encino Vázquez

Nombre del tema: Principales enfermedades
exantemáticas de la infancia:

Parcial: I


Nombre de la Materia: Pediatría

Nombre del profesor: Dr. Miguel Maza Lopez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Cuatrimestre-Semestre

CUADRO COMPARATIVO



AGENTE ETIOLOGICO

SARAMPION

Virus del sarampión, ARN, Paramyxoviridae.

RUBEOLA

Togavirus del género Rubivirus.

VARICELA

Virus de la varicela-zóster (VZV)

PERIODO DE INCUBACION

7 a 14 días.

18 días en promedio (14 a 21 días).

14 a 21 días (en promedio 14)

PRODRONOMOS

- Fiebre alta (>39°C).
- Triada clásica: Tos, coriza (rinorrea), conjuntivitis.
- Manchas de Koplik en la mucosa oral.

- Malestar general, fiebre baja, adenopatías retroauriculares y occipitales.
- Leves síntomas respiratorios.

Fiebre moderada que persistirá durante 2 a 4 días, malestar general, hiporexia y cefalea

CUADRO CLINICO

Exantema: Inicia retroauricular con progresión cefalocaudal; maculopapular, no pruriginoso.

Exantema: Maculopapular, no pruriginoso; inicia en cara y se extiende.


Exantema febril: En brotes, centrifugo, mácula-pápula-vesícula-pustula-costra

TRATAMIENTO

Farmacológico: Administración de vitamina A
No farmacológico: ofrecer un aporte adecuado de líquidos y nutrientes

- Mantener aislamiento para evitar contagio ☐
- La fiebre se controlará con medios físicos
- Alimentación habitual ☐
- Baño diario con agua tibia no tallar la piel

Sintomático con agentes antipruriginosos locales y sistémicos, así como sedación si se requiere.



CUADRO COMPARATIVO



AGENTE ETIOLOGICO

EXANTEMA SUBITO

Virus del herpes humano 6 (HHV-6).

ENFERMEDAD PIE-MANO-BOCA

Virus Coxsackie A 16 y otros entorovirus

ERITEMA INFECCIOSO

Parvovirus B19

PERIODO DE INCUBACION

5 a 15 días

3 a 7 días.

14 a 18 días

PRODRONOMOS

- Fiebre alta sin otros síntomas.
- Irritabilidad.
- Rechazo al alimento

- Fiebre moderada.
- Malestar general, dolor de garganta.

Fiebre leve, malestar, dolor de cabeza y síntomas respiratorios leves.

CUADRO CLINICO

Exantema:
Maculopapular generalizado.
Aparece al bajar la fiebre.
Duración: 5-7 días en total.

Vesículas en manos, pies y boca, dolorosas.


- El signo de la mejilla abofeteada
- Fiebre leve y adenopatías.
- Exantema maculopapular en encaje; en la parte alta del tronco y extremidades proximales,

TRATAMIENTO


Asintomatico

Hidratar y en caso de haber úlceras en la boca evitar bebidas ácidas pues pueden causar dolor.

- Hidratación
- Sintomatico como antihistamínicos y antipiréticos



CUADRO COMPARATIVO



BIBLIOGRAFÍA

- 36. RUBEOLA. (S/F). VACUNASAEP.ORG. RECUPERADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE [HTTPS://VACUNASAEP.ORG/DOCUMENTOS/MANUAL/CAP-36](https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-36)
- FIFTH DISEASE. (S/F). STANFORDCHILDRENS.ORG. RECUPERADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE [HTTPS://WWW.STANFORDCHILDRENS.ORG/ES/TOPI/DEFAULT?ID=FIFTH-DISEASE-90-P05003](https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=fifth-disease-90-p05003)
- (S/F). GOB.MX. RECUPERADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE [HTTPS://WWW.IMSS.GOB.MX/SALUD-EN-LINEA/VIRUS-COXSACKIE](https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/virus-coxsackie)
- (S/F-A). GOB.MX. RECUPERADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE [HTTPS://WWW.IMSS.GOB.MX/SITES/ALL/STATIC/GUIASCLINICAS/588GER.PDF](https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/588GER.PDF)
- (S/F-B). GOB.MX. RECUPERADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE [HTTPS://WWW.IMSS.GOB.MX/SITES/ALL/STATIC/GUIASCLINICAS/109GRR.PDF](https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/109GRR.PDF)
- (S/F-C). GOB.MX. RECUPERADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE [HTTPS://WWW.IMSS.GOB.MX/SITES/ALL/STATIC/GUIASCLINICAS/469GRR.PDF](https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/469GRR.PDF)

