

# HEMORRAGIA OBSTETRICA



## ¿QUE ES?

Es la pérdida sanguínea que puede presentarse durante el periodo grávido o puerperal, superior a 500 ml post-parto o 1000 ml post-cesárea proveniente de genitales internos o externos. La hemorragia puede ser hacia el interior (cavidad peritoneal) o al exterior (a través de los genitales externos).



## EPIDEMIOLOGIA

La Organización Mundial de la Salud reporta que existen en el mundo 536,000 muertes maternas al año, de las cuales 140,000 son originadas por hemorragia obstétrica, representando el 25% del total de las muertes maternas. Más del 50% de estas muertes se presentan en las primeras 24 horas post-parto.



## FACTORES DE RIESGO

- OBESIDAD
- MIOMATOSIS UTERINA
- CIRUGIA UTERINA PREVIA
- ANEMIA/ DESNUTRICION
- ANTECEDENTES DE HEMORRAGIA EN EMBARAZO PREVIO
- EDAD MENOR DE 16 AÑOS Y MAYOR DE 35 AÑOS
- TRABAJO DE PARTO PROLONGADO



clasificación (definición, causas, síntomas y tratamiento).

Las hemorragias obstétricas se clasifican según su gravedad, ubicación, ubicación y momento de ocurrencia


## POR GRAVEDAD

- Hemorragia leve: pérdida de sangre menor a 500 ml.
- Hemorragia moderada: pérdida de sangre entre 500-1000 ml.
- Hemorragia severa: pérdida de sangre mayor a 1000 ml.



## POR UBICACION

- Hemorragia vaginal: Sangrado en la vagina.
- Hemorragia retro placentaria: sangrado detrás de la placenta.



## POR MOMENTO

- Ante parto: sangrado tiempo antes del parto.
- Intra parto: el sangrado durante el tiempo de parto
- Post parto: sangrado después del parto.





## OTRAS CLASIFICACIONES

- Hemorragia por atonía uterina: sangrado por la falta de contracciones o contracciones nulas del útero.
- Hemorragia por una placenta acreta: cuando la placenta se adhiere demasiado a las paredes uterinas
- Hemorragia por laceraciones: cuando hay un desgarro durante el parto.

## TRATAMIENTO

EL TRATAMIENTO VA A DEPENDER DE LA CAUSA DE LA HEMORRAGIA, POR EJEMPLO: SI LA PACIENTE PRESENTA UNA ATONÍA UTERINA SE LE VA A ADMINISTRAR UNA HORMONA SINTÉTICA LLAMADA OXITOCINA, POR UNA VÍA INTRAVENOSA. SI EL CASO ES MÁS SEVERO SE LE APLICARÁ UNA HISTERECTOMIA QUE ES LA EXTIRPACIÓN TOTAL DEL ÚTERO.

SI LA HEMORRAGIA ES POR UN AGRETISMO PLACENTARIO VA A SER UNA HISTERECTOMIA



## Nemotecnia de las 4 T

Las 4T con las causas de los sangrados que ocurren tras el parto. En concreto, este término hace referencia a: tono, trauma, tejido y trombina.

### TONO

- El tono o la atonía uterina es la causa más frecuente de la hemorragia obstétrica y suele estar provocada por una sobredistensión del útero. Por ello, el embarazo múltiple es un factor de riesgo para la atonía uterina.

### TRAUMA

El trauma supone el 20% de los casos de las hemorragias postparto y se deben a desgarros en el canal del parto, inversión del útero o la ruptura uterina.

### TEJIDO

EL TEJIDO SE REFIERE A LA RETENCIÓN DE PRODUCTOS DE CONCEPCIÓN

### TROMBINA

La trombina se refiere a las alteraciones de coagulación del cuerpo