



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Claudia Elizabeth Ramirez Alfaro

Nombre del tema: Hemorragia obstétrica.

Parcial: III

Nombre de la Materia: Submodulo I

Nombre del profesor: Maria José Hernández Méndez

Nombre de la carrera: Enfermería



HEMORRAGIA OBSTETRICA

Qué es ?



Es un término que se usa para el sangrado que ocurre durante el embarazo, el parto o el puerperio superior 500 ml post-parto y 1000ml post-cesaria.



¿EPIDEMIOLOGÍA?

La Organización mundial de la salud reporta en en el mundo que existen 536,000 muertes maternas al año de las cuales 140,000 son originadas por hemorragia obstetrica , representando el 25 % del total de las muertes maternas más del 50 % estas muertes se presentan a las primeras 24 hrs post-parto.

Atonia Uterina :Es la perdida de grandes cantidades de sangre de los vasos sanguíneos que se relaciona con el aparato reproductor después de dar a luz.



ACRETISMO PLACENTARIOS.

ES LA INSERCIÓN ANORMAL DE PARTE O DE TODA LA PLACENTA, CON AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE LA DECIDUA BASAL Y ANORMALIDAD DE LA CADUCA VERDADERA CON PENETRACIÓN DE LAS VELLOSIDADES CORIALES AL MIOMETRIO.



RETRACCIÓN PLACENTARIA O DE RESTOS PLACENTARIOS.

A RETENCIÓN DE RESTOS PLACENTARIOS IMPIDE LA RETRACCIÓN DE LA MUSCULATURA DEL ÚTERO CONLLEVANDO A LA PERDIDA DE SANGRE FUERA DE LOS NIVELES NORMALES. CONSIDERÁNDOSE QUE EN EL PARTO VAGINAL LA PERDIDA PROMEDIO NORMAL DE SANGRE ES DE 500CC.




INVERSIÓN UTERINA:

Es la cual se produce cuando el útero da vuelta después del parto. Los síntomas incluyen sangrado posparto, dolor abdominal, una masa en la vagina y presión arterial baja. Rara vez la inversión puede ocurrir no asociada con el embarazo.



CLASIFICACIÓN HEMORRAGIA OBSTETRICA Causa Extrauterina



Desgarros o laceraciones del tracto vaginal: son comunes durante el parto. A menudo ocurren cuando la cabeza de un bebé pasa por el orificio vaginal. Estos desgarros generalmente se deben a que la cabeza es demasiado grande para que la vagina se estire, o a que la vagina no se estira con facilidad.

TRANSTORNOS DE LA COAGULACIÓN?

Quiere decir que no tiene suficientes plaquetas o factores de coagulación o éstos no funcionan como deberían. Los problemas de coagulación pueden ocurrir por otras enfermedades, como enfermedades hepáticas severas o falta de vitamina K. También pueden ser hereditarios.



Tono: Atonia Uterina la incapacidad uterina de encogerse posterior al parto y la expulsión del feto del vientre materno.



TROMBINA : ALTERACIÓN DE LA COAGULACIÓN

LOS FACTORES DE COAGULACIÓN INTERACTIVAN SOBRE LAS SUPERFICIES DE LAS PLAQUETAS Y LAS CELULAS ENDOTELIALES PARA PRODUCIR TROMBINA, QUE CONVIERTE EL FIBRINOGENO EN FIBRINA.



TRAUMA : LESIÓN Y DESGARRO
LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS.



TEJIDO- Es RETENCIÓN ,
COAGULACIÓN O RESTOS
PLACENTARIOS SON RESTOS
PLACENTARIOS DENTRO DE LA
CAVIDAD UTERINA DESPUÉS DE
UN PROCESO OBSTÉTRICO.

