



Mi Universidad

Vacunas

Erwin Emmanuel Pérez Pérez

Parcial IV

Crecimiento y desarrollo

Dr. Jorge López Cadenas

Medicina Humana

Tercer Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de diciembre de 2024

Vacuna	Indicaciones	Vía de administración	Grupo de edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
BCG	Prevención para la tuberculosis	Intradérmica	Niños nacidos (al nacer)	una sola dosis	1 dosis 0.1 ml	<ul style="list-style-type: none"> Reacciones alérgicas Immunosupresión
Hepatitis B	Prevención de la infección por virus de hepatitis B	Intramuscular	Niños nacidos adultos y niños	3 dosis = • 1 nacer • 2 y 6 meses	3 dosis 0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> Reacciones alérgicas
Exavalente	Prevención de Difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, Poliomielitis, Haemophilus Influenzae tipo B	Intramuscular	Niños de = 2, 4 y 6 meses	3 dosis = • 2, 4 y 6 meses	3 dosis 0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> Reacciones alérgicas a algunos componentes.
DPT	Prevención de Difteria, tétanos y tos ferina	Intramuscular	Niños de 4 a 6 años	1 dosis = • 4 y 6 años	1 dosis 0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> Encefalopatía Alergia a algún componente
Rotavirus	Prevención de gastroenteritis causada por rotavirus	Oral	Niños de 2 y 4 meses	2 dosis = • 2 y 4 meses	2 dosis 1.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> Encefalopatía Reacciones alérgicas
Antineumocócica	Prevención de meningitis y otras infecciones por Streptococcus pneumoniae	Intramuscular	Niños de 2, 4 y 12 meses	3 dosis = • 2, 4 y 12 meses	3 dosis = 0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> Immunosupresión Reacciones alérgicas
Influenza	Prevención de la gripe causada por virus de la influenza	Intramuscular	Niños de 6 meses y adultos	Anual <u>1</u> dosis	1 dosis anual 0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> Alergia a proteína del huevo o componente de la vacuna
Poliomielitis	Prevención contra la poliomielitis	Oral	Niños de 6 meses a 4 años	Dosis única (Vacunación periódica)	1 dosis 2 gotas	<ul style="list-style-type: none"> Immunodeficiencias Enfermedades graves

Vacuna	Indicaciones	Vía	Grupo de edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
SR	Prevención con Sarampión rubéola, Parotiditis	Subcutánea	Niños de 12 meses y 6 años	2 Dosis: • 12 meses • 6 años	2 Dosis 0.3 ml	• Reacciones alérgicas
Hepatitis A	Prevención por el virus de hepatitis A	Intramuscular	Niños de 12 meses y mayores	2 Dosis: • 12 meses • 6 meses después	2 Dosis 0.5 ml	• Reacciones alérgicas
SRP	Prevención con Sarampión rubéola, Parotiditis	Subcutánea	Niños de 1 a 6 años	2 Dosis: • 12 meses • 6 años	2 Dosis 0.5 ml	• Embarazo • Inmunodeficiencias
Antirubéola	Prevención para la Rubéola	Subcutánea	Niñas de 9 años y adolescencia	1 Dosis	1 Dosis 0.5 ml	• Embarazo • Inmunodeficiencias
VPH	Prevención de cáncer Cervicouterino	Intramuscular	Adolescentes 9 a 14 años	2 Dosis: • 9 años • 2 dosis a 6 meses	2 Dosis 0.5 ml	• Alergia a algún componente
Anticelénica	Prevención para cefera	Oral	Niños y adultos	2 Dosis	2 Dosis 3 ml	• No administrar a Pacientes con diarrea grave
Antimalárica	Prevención de la malaria (zonas endémicas)	Oral	Niños y adultos en zonas endémicas	Previamente durante zona endémica	Según la Prescripción médica	• Hipersensibilidad a la medicina • Enfermedades graves