

UDS

Mi Universidad



ALUMNO:

Brayan Henry Morales López

GRADO: Tercer Semestre

GRUPO: A

VACUNA:	INDICACIONES	VIA DE ADMINISTRACION	GRUPO DE EDAD	ESQUEMA DE Y DOSIS	CONTRA INDICACIONES.
BCG	Prevención de tuberculosis meningea	Intradermica (deltoides brazo)	Recien nacidos (Antes del año)	Dosis unica : 0.1 ml	Fiebre $> 38.5^{\circ}$, peso $< 2000g$, quimioterapic embarazo
HEPATITIS B Y A.	Prevención de infección por el virus de hepatitis B.	Intramuscular	Recien nacidos y adolescentes ≥ 11 años.	Recien nacidos: 0, 2, 6 meses (0.5 ml) Adolescentes: 2 dosis (20 mcg) interubede	Hipersensibilidad, fiebre, enfermedad moderada o grave.
DPT	Refuerzo de gastroenteritis por difteria, tétanos, tos ferina	Intramuscular (deltoides brazo)	Niños de 4 años	Dosis Unica 0.5 ml	Edad > 6 años, encefalopatia, enf neurological progresiva
ROTAUIRUS	Prevención de gastroenteritis por rotavirus	Oral	Niños menores de 8 meses	RUI: 2 dosis (1 y 4 m) Rus: 3 dosis (2, 4, 6 meses) intervalo 4 semanas entre do	Alergia, intususcepción precia, malformación gastrointestinal no corregida
Neumococo 13V	Prevención de infecciones invasivas por streptococcus	Intramuscular	Niños de 2-5 años	3 dosis : 2, 4, 12 meses ; 0.5 ml por dosis.	Alergia severa a componentes fiebre ≥ 38.5 .

VACUNA	INDICACIONES	VIAS DE ADMINISTRACION	GRUPO DE EDAD	ESQUEMA DE VACUNACION	CONTRAINDICACIONES
NEUMOCOCCO 23 V	Prevención de neumonia en adultos mayores	Intramuscular o Subcutánea.	Mayores de 60 años o con factores de riesgo.	Dosis única: 0.5 ml	Alergias a Componentes de la vacuna.
INFLUENZA	Prevención de influenza estacional	Intramuscular (deltoides)	≥ 6 meses, con refuerzo anual	Primera vez: 2 dosis sep 4 semanas	Alergia a Componentes de la vacuna.
(Sabin) POLIO	Prevención de poliomielitis	Oral	Niños de 6 meses a 5 años.	2 dosis durante campaña o a use	Inmunosupresión, embarazo, enf febriles agudas
SR	Prevención de Sarampión y Rubéola	Subcutánea.	A partir de 10 años sin esquema previo	2 dosis separadas por 4 semanas	Alergia al huevo, fiebre, enf aguda.
SRP	Prevención de Sarampión, rubéola y paperitis.	Subcutánea	Niños de 1 y 6 años	2 dosis sep: 12 meses y 6 años	Igual que SR ↑
UPH	Prevención de infecciones por UPH y cáncer cervicouterino	Intramuscular deltoides	Niñas de 9-14 años (esto de principio)	2 dosis (0 y 6 meses)	Hipersensibilidad a Componentes
ANTICOLERICO	Prevención del cólera	Poblaciones en riesgo en zonas endémicas Oral	Población en riesgo en zonas endémicas	2 dosis sep por 1-6 semanas	Alergia a Componentes, embarazo, diarrea severa o vómito.

VACUNA	INDICACIONES	VIAS DE ADMINISTRACION	GRUPO DE EDAD	ESQUEMA Y DOSIS	CONTRAINDICACIONES.
ANTI MALARICA	Prevenición de malaria (Experimental)	Intramuscular	Poblaciones en zonas endémicas	Esquema específico dependiente del biológico (no universal en México).	No Aplicar en caso Sin malaria

Bibliografías:

1. Secretaría de Salud. (2012). NOM-036-SSA2-2012: Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano. Diario Oficial de la Federación.
2. Secretaría de Salud. (2021). Manual de vacunación. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Ciudad de México: Secretaría de Salud.