



Mi Universidad

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Williams Said Pérez García

Reanimación neonatal

Primer parcial

Crecimiento y desarrollo


Dr. Jorge López Cadenas

Medicina humana

Tercer semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 14 de septiembre del 2024

REANIMACIÓN NEONATAL



0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0

NO ← FC < 60 x

Si ↓

intubar compresiones torácicas

FC < 60 x ↓

Adrenalina IV

Ventilación con presión +

frecuencia = 40 - 60 x
Ritmo y tiempo respiratorio =
Ventila dos, tres - ventila dos, tres
Presión = 20-25 cm H₂O
I UIUO = 30 segundos

Pasos correctivos

M = aslata : ajustela
R = eposición vía aerea
S = ucción en boca natis
O = boca abierta
P = rección aumentela
A = iterne vía aerea

Intubación orotraqueal

Hoja recta laringoscopio

- Nº 1 RNT
- Nº 0 RNPT
- Nº 00 RNPT externos

¿cómo introducir tubo endotraqueal

Distancia del tabique nasal
al trozo de oreja 1cm

Compresiones torácicas

Profundidad: 1/3 de diámetro
anteroposterior del tórax
frecuencia: 90 x
coordinación = 3 compresiones
1 ventilación cada 2 segundos
Ritmo: uno, dos, tres y ventila

Adrenalina

concentración = 1:10 000 (0.1 mg/ml)

vía y dosis

IV 0.1 - 0.3 ml / kg

ET - 0.5 - 1 ml / kg

Se puede repetir dosis

cada 3-5 minutos

Deterioro repentino post-intubación

D = Tubo endotraqueal desplazado

O = Tubo endotraqueal obstruido

P = neumotórax

E = falla de equipo

Peso	D, tubo endotraqueal	SDE
< 1.0	2.5	228
1.0 - 2.0	3.0	28 - 34
> 2	3.5	> 34