



Mi Universidad

Cuadro Vacunas

Daniel de Jesús Berrios Jiménez

NOM-036-SSA2-2012

Parcial IV

Crecimiento y Desarrollo

Dr. Jorge López Cadenas

Licenciatura en Medicina Humana

Tercer Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de diciembre de 2024

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012.

VACUNA.	INDICACIÓN.	VIA. ADMINISTRACIÓN.	EPAD.	ESQUEMA.	DOSIS.	CONTRA INDICACIÓN.
BCG Inofertilizada.	Inmunización activa contra formas graves de tuberculosis (Miliar y Meningea).	Intradérmica, Región deltoidea brazo derecho	• RN (1 año) • 4 años + • 14 años + Excepcional.	Dosis Única	0.1 mL.	Fiebre > 38.5°C. Peso < 2000g. Dermatitis progresiva. Inmunosupresión. Embarazo.
Antihepatitis B recombinante.	Inmunización activa contra infección por virus hepatitis B y sus consecuencias potenciales.	Intramuscular. <18m: M. anterolateral Muslo izquierdo. >18m: M. deltoidea Brazo derecho.	• RN (12 hrs) Máximo 7 días post nacimiento.	0, 2, 6 meses. <2kg: 0, 2, 4, 6 m. ADOLESCENTES. 1ra = Dosis 0 2da = 4 sem. (1ra)	Niños 5-10kg en 0.5 mL. ADOLESC. 20kg en 1.0 mL.	Hipersensibilidad. Enf. Moderada/grave con o sin presencia de fiebre.
Pentavalente acelular (OPaT + VIP + Hib)	Inmunización activa contra difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis e infecciones invasivas H. influenzae-b.	Intramuscular; <18m: 1/3 medio de cara anterolateral externa muslo derecho. >18m: M. deltoidea brazo derecho.	< 5 años	4 dosis: 2, 4, 6, 18 meses.	0.5 mL	Rx anafiláctica post vacuna Alergia neomicina, estreptomina o polimixina B Fiebre > 38.5°C.
Antirrotavirus	Prevención de gastroenteritis causada por rotavirus	Oral	< 8 meses	RV1: 2, 4 meses RV5: 2, 4, 6 meses (antes de 8 meses)	RV1: 1.5 mL RV5: 2.0 mL	Hipersensibilidad vacuna Diarrea/Mecral, Px intolerancia fructosa, mala abs. glucosalgalactosa Insuficiencia sacarasa-isomaltasa Intususcepción y alergia later.
Antineumococica conjugada.	Inmunización activa contra infecciones neumococicas invasivas por S. pneumoniae.	Intramuscular; <18m: 1/3 medio de a. anterolat. ext. del muslo derecho. >18m: M. deltoidea brazo.	2 - 59 meses	2, 4, 12 meses	0.5 mL.	Hipersensibilidad vacuna padecimientos agudos febriles Superiores a 38.5°C.
Antiinfluenza de virus completos, fraccionados y subunidades.	Inmunización activa contra la infección por virus de la influenza tipo A y B.	Intramuscular. <18m: 1/3 cara anterolateral muslo izquierdo >18m: M. deltoidea brazo izquierdo.	6 - 59 meses y > 60 años	Dosis Anual.	6-35 meses: 0.25 mL. 36 m - 8a: 0.25 mL (0.5 mL) > 9a: 0.5 mL	Hipersensibilidad vacuna Alergia a Prot. huevo, < 6 meses, Guillain Barre, Fiebre > 38.5°C Enfermedad med o grave.
Triple viral SRP. (Antisarampión Antirrubéola y Antiparotiditis).	Inmunización activa contra sarampión, rubéola y parotiditis.	Subcutánea, área superior del tríceps en el brazo izquierdo	12 meses y 6 años	1º = 12 meses 2º = 6 años.	0.5 mL.	Enf. Hematológica, Fiebre > 38.5°C. Enf. graves Tx inmunosupresor Alergia huevo y transfi de 1g.
Antipoliomielítica trivalente oral tipo SABIN (VOP)	Inmunización activa contra poliomielitis.	Oral	niños < 5 años y 5 años (riesgo epid.)	Una dosis (6m - 4a). Si reabieron al menos 2 dosis de Pentavalente.	0.2 mL (dos gotas)	Inmunodeficiencias, Fiebre > 38°C. Tx inmunosupresor Hipersensibilidad.
Doble viral SA. (Antisarampión y Antirrubéola).	Inmunización activa contra el sarampión y la rubéola.	Subcutánea, área superior del tríceps en el brazo izquierdo	• a partir de 10 años • 1-4 años	• Dosis única (refuerzo). • Dos Dosis (intervalo 3 mes Pk sin SA o SRP).	0.5 mL	Embarazadas, Inmunodeficiencias, Fiebre > 38.5°C, Pad. Neurológicos, oncológicos, Rx Huevo transf. Ig, Tx inmunosupr.
Antineumococica de 23 serotipos	Inmunización activa contra infección por Streptococcus pneumoniae	Intramuscular, región deltoidea del brazo derecho	≥ 65 años	Dosis Única.	0.5 mL.	Fiebre > 38.5°C, Hipersensibilidad a la vacuna.
Antihepatitis A activada.	Inmunización activa contra infección por virus hepatitis A.	Intramuscular. <18m: 1/3 medio cara anterolat ext. muslo. >18m: M. deltoidea brazo	• 12 meses • 12m - 3a. • < 8 años	2 dosis: • dosis cero • 6-12 meses después.	1-18 años: 0.5 mL. > 18 años: 0.5 mL + 1 mL.	< 1 año edad, hipersensibilidad Fiebre embarazo lactancia.
Antitétanos acelular con toxoides difterico y tetánico (OPaT).	Inmunización activa contra difteria, Tos ferina y Tétanos	Intramuscular. <18m: 1/3 medio cara anterolat ext muslo >18m: M. deltoidea brazo.	Lactantes 2 meses y < 7 años.	Refuerzo y los 4 años.	0.5 mL.	Hipersensibilidad. Encefalopatía. Rx anafiláctica post vacunación.
Antirrubéola inofertilizada.	Inmunización activa contra la rubéola.	Subcutánea, área superior, externa tríceps brazo izquierdo.	a partir 1 año	Dosis única.	0.5 mL.	Embarazo Fiebre > 38.5°C. Enf. graves Inmunodeficiencia Tx inmunosupresor Alergia Neomicina.
Contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).	Inmunización para la prevención de infecciones por el virus del papiloma humano	Intramuscular, Región deltoidea del brazo izquierdo.	Niñas 9 años.	1er. = dosis cero 2da = 1-2 mes (int). 3ra = 6 mes. (1ra).	0.5 mL.	Embarazo Hipersensibilidad. Fiebre > 38.5°C. < 9 años. Enf. Aguda/Grave/Suera.
Anticólera inactivada Oral.	Inmunización activa contra el cólera.	Oral.	> 2 años.	2-6 años: 3 dosis. Interu 1-8 sem. > 6 años: 2 dosis Interu 1-6 sem.	> 5 años: 150 mL 2-5 años: 75 mL.	< 2 años Enf. febriles o gastrointestinales Tx antibióticos Inmunodeficiencia Hipersensibilidad.
Antiamarilica Atenuada.	Inmunización activa contra la Fiebre amarilla	Subcutánea, región deltoidea del brazo	> 9 meses. en zonas endémicas	Una dosis y refuerzo cada 10 años.	0.5 mL	Hipersensibilidad. Inmunodeficiencia. Tx inmunosupresor VH. Enf. Neoplásicas malignas. Embarazo y < 6 meses.