



Mi Universidad

Esquema de Vacunación

*Jonathan Omar Galdámez Altamirano
Parcial IV
Crecimiento y Desarrollo
Dr. Jorge López Cadenas
Medicina Humana
Tercer Semestre*

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de Diciembre de 2024

Esquema de Vacunación

Vacuna	Indicación	Vía de administración	Grupo de edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
BCG	Prevención de tuberculosis miliar y meningitis tuberculosa.	Intradérmica.	Recién nacidos. (<5 años sin vacuna)	Única dosis al nacimiento.	0.1 ml	• Inmunodeficiencia • Peso < 2 kg.
Hepatitis A	Prevención de hepatitis A.	Intramuscular.	Niños > 1 año en grupos de riesgo	1 o 2 dosis según el fabricante	0-5 ml	• Alergia a los componentes de la vacuna.
Hepatitis B	Prevención de Hepatitis B.	Intramuscular.	Todas las edades especialmente en recién nacidos.	3 dosis: Al nacimiento a los 2, y 6 meses	0.5 ml (<10 años) 1 ml (>10 años)	• Alergia a los componentes de la vacuna.
Hexavalente Acelular.	Prevención de DPT, Hib, Poliomieltitis Hepatitis B.	Intramuscular.	Menores de 5 años	4 dosis: 2, 4, 6 y 18 meses	0.5 ml.	• Fiebre alta • Rx alérgica grave.
DPT	Refuerzo contra difteria, tos ferina, tétanos.	Intramuscular.	Niños de 4 años	Única dosis.	0.5 ml.	• Encefalopatía no explicada.
Rotavirus	Protección de gastroenteritis por rotavirus.	Oral	Menores de 8 meses.	2 o 3 dosis según su presentación: 2, 4 (± 6 meses)	Según el fabricante.	• Invasión intestinal previa.
Anti neumococo conjugada (niños)	Prevención de infecciones neumocócicas en niños.	Intramuscular.	Menores de 5 años.	3 dosis: 2 y 4 refuerzo a los 12 meses.	0.5 ml.	• Alergia a los componentes de la vacuna.
Anti neumococo 23 valente (Adultos)	Prevención de infecciones neumocócicas en adultos.	Intramuscular o Subcutánea.	Adultos ≥ 65 años. ≥ 60 años con factores de riesgo.	Única dosis. (refuerzo cada 5 años en riesgo)	0.5 ml	• Alergia a los componentes de la vacuna.

Vacuna	Indicación	Vía de administración	Grupo de edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
Influenza	Prevención de la influenza estacional	Intramuscular	> 6 meses y a los grupos de riesgo	Anual	0.25 ml (< 3 años) 0.5 ml (> 3 años)	• Alergia al huevo • Fiebre alta
Poliomieltitis (Sabin)	Prevención de Poliomieltitis.	Oral	Menores de 5 años	2 dosis en campañas nacionales	2 gotas	• Inmunodeficiencia • Embarazo.
SR	Prevención de Sarampión y la Rubéola	Subcutánea	> 10 años en quienes no tengan el esquema completo	1 dosis	0.5 ml	• Embarazo • Inmunodeficiencia grave.
SRP	Prevención de Sarampión, Rubéola y Parotiditis.	Subcutánea.	Niños de 1 y 6 años	2 dosis: 1 y 6 años	0.5 ml	• Embarazo • Inmunodeficiencia grave.
Anti-Rubéola	Prevención de Rubéola y síndrome de Rubéola congénita.	Subcutánea.	Mujeres en edad fértil sin esquema previo	1 dosis.	0.5 ml	• Embarazo • Inmunodeficiencia grave.
(VP4)	Prevención de infección por (VPH) virus del Papiloma humano	Intramuscular	Niños de 5º grado de Primaria o 11ª mujeres con VIH hasta 45 años	2 dosis: 0 y 6 meses.	0.5 ml	• Embarazo • Fiebre alta.
Anticólera	Prevención de cólera.	Oral	Población de riesgo durante brotes.	2 dosis con intervalo de 2 semanas.	1.5 ml	• Reacción grave a los componentes.
Antimalárica	Prevención y tratamiento de malaria.	Oral	Población en áreas endémicas	según el esquema de profilaxis o tratamiento	según especificaciones	• Hipersensibilidad a los componentes.