

Universidad del sureste.  
Lic. Medicina humana.

UDS

Esquema de vacunación,  
Nom-036-SSA2-2012.

Alumno: Rodolfo Alejandro Santiago Gómez

Materia: Crecimiento y Desarrollo

Grado: 3

Grupo: A

Docente: Dra. Jorge.

Comitán de Domínguez a 13/12/2021.

Vacuna	Indicaciones	Vía de administración	Grupo de edad	Esquema	Dosis.	Contra Indicaciones
BSG	Previene de la tuberculosis meningea. Vacuna para recién nacidos	Intradérmico (brazo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recién nacido</li> <li>• hasta los 12 años de edad</li> </ul>	1 dosis. al nacer hasta los 12 años	1 dosis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reacción alérgica</li> <li>• Fiebre</li> <li>• Personas con               <ul style="list-style-type: none"> <li>- VIH</li> <li>- Quimio.</li> </ul> </li> </ul>
Hepatitis B	Prevención contra la hepatitis B	Intramuscular.	Desde el nacimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 al nacer</li> <li>• 1 a los 2 meses</li> <li>• 1 a los 6 meses.</li> </ul>	3 dosis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipersensibilidad grave a la vacuna</li> <li>• Levadura</li> <li>• Fiebre</li> <li>• Anafilaxia</li> </ul>
Hexavalente	Prevención de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Difteria</li> <li>- tétanos</li> <li>- tos ferina</li> <li>- hepatitis B</li> <li>- Influenza</li> <li>- Poliomielitis</li> </ul>	Intramuscular.	Niños a partir de los 2 meses.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1, 2 meses</li> <li>- 1, 4 meses</li> <li>- 1, 6 meses</li> </ul>	3 dosis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alergia a algunos de los componentes</li> <li>• Fiebre</li> <li>• Reacción adversa previa.</li> </ul>

<p>DPT (Difteria, tetanos, tos ferina)</p>	<p>Prevención de difteria, tetanos y tos ferina.</p>	<p>Intramuscular</p>	<p>Niños a partir de los 2 meses</p>	<p>3 dosis: - 2 meses - 4 meses - 6 meses Refuerzo: 18 meses 4-6 años.</p>	<p>3 dosis y Refuerzos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reacción alérgica grave</li> <li>• Encefalopatía,</li> </ul>
<p>Rotavirus</p>	<p>Prevención de gastroenteritis por Rotavirus</p>	<p>Oral</p>	<p>1 niños desde los 2 meses.</p>	<p>2 o 3 dosis (dependiendo del tipo de vacuna 2, 4 6 meses)</p>	<p>2 o 3 dosis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunodeficiencia - VIH.</li> </ul>
<p>Antineumocócica 13</p>	<p>Prevención de infecciones por Streptococo pneumoniae (meningitis)</p>	<p>Intramuscular</p>	<p>Niños menores de 5 años y adultos con riesgo.</p>	<p>1 dosis inicial y en casos de refuerzo a los 2-3 años.</p>	<p>1 dosis inicial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipersensibilidad</li> <li>• Fiebre alta</li> <li>• Taquifibración</li> </ul>
<p>Antineumocócica 23</p>	<p>- Neumonía - Meningitis en adultos y personas en riesgo.</p>	<p>Intramuscular o subcutánea</p>	<p>Adultos mayores de los 65 años y en riesgo</p>	<p>1 dosis inicial, Refuerzo a los 5 años</p>	<p>1 dosis inicial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiebre alta</li> <li>• Alergia a los componentes de la Vacuna.</li> </ul>

Influenza	Prevención de la Influenza estacional	Intramuscular	Niños a partir de los 6 meses y adultos	1 dosis anual.	1 dosis anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alergia grave a los huevos</li> <li>• Fiebre</li> <li>• Taquifilaria</li> </ul>
Antipolio	Prevención de la poliomielitis	Intramuscular 0 Subcutáneo	Niños menores de 5 años	4 dosis: - 2 meses - 4 meses - 6 meses Refuerzo: 18 meses!	4 dosis Iniciales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alergia a la vacuna</li> <li>• Quimiotrópico</li> <li>• VIH avanzado.</li> </ul>
BCG (tuberculosis)	Prevención de la tuberculosis	Intradérmica (en el brazo)	Recién nacidos.	1 dosis al nacer	1 dosis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alergia a la Vacuna.</li> </ul>
Hepatitis A.	Prevención de la hepatitis A	Intramuscular	A partir del año de edad.	2 dosis: al nacer y a los 6 meses	2 dosis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipersensibilidad</li> <li>• galactina</li> <li>• antibióticos</li> <li>• Fiebre.</li> </ul>

SRA	Prevención: - Sarampión - Rubéola - Parotinitis (Paperas).	Subcutánea	Niños a partir de 1 año	2 dosis: 1: 12 meses 1: 6 años	2 dosis	• Hipersensi- bilidad - Fiebre • Anafilaxia
Antirubéola	Prevención: Rubéola.	Subcutánea	Niños a partir de los 12 meses	- 12 meses - 6 años	2 dosis	• Embarazo • Alergia a la vacuna
Anticólera	Prevención Contra el cólera.	Oral	En zonas endémicas niños y adultos	2 dosis: - 12. - 1-6 semanas de diferencia	2 dosis.	• Fiebre • Enf. aguda de Diarrea.