



UDRS

Mi Universidad

Dannia Gissela Díaz Díaz

4to Parcial

Crecimiento y Desarrollo

Doctor. Jorge López Cadenas

Medicina Humana

3er Semestre, Grupo "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de diciembre del 2024

VACUNAS	INDICACIONES	VIA DE ADMIN	GRUPO DE EDAD	Esquema	DOSES	Contraindicaciones
Vacuna BCG liofilizada	Para la inmunización activa contra las formas graves de tuberculosis.	Via intradérmica en región deltoidea del brazo derecho.	Niños recién nacidos (antes del 1er año de edad). - Se puede vacunar a los 4 años. - Hasta los menores de 14 años.	Dosis única	0.1 ml	Puede haber fiebre leve o aguda mayores de 38.5°C. Niños con peso inferior a 2000g, dermatitis progresiva, eczema, Enfermas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, o que reciben tx inmunosupresor.
V. anti-hepatitis recombinante	Inmunización activa contra la infección por el virus de la hepatitis B (aguda y crónica), la insuficiencia y la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular.	Intramuscular en menores de 18 meses de edad en la cara anterolateral externa del muslo. En mayores de 18 meses en la región deltoidea del brazo derecho.	R. U. en las primeras 12 hrs de vida o antes del egreso, máximo 7 días post al nacimiento.	Primera 12 hrs de vida 2, 2 meses 3, 6 meses - 2 dosis de 20 mcg	5 a 10 kg en 0.5 ml 10 kg en 1 ml 20 kg en 1 ml	Personas con antecedentes de hipersensibilidad a uno o más componentes de la vacuna.
V. pentavalente celular (DTPa+VIP+Hib)	Para la inmunización activa contra la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b.	IM, tercio medio de la cara anterior lateral externa del muslo derecho en menores de 18 meses, en mayores de 18 meses en la R. deltoidea del brazo derecho.	Niños menores de 5 años.	Cuatro dosis con intervalos de 2 m. la tercera a los 6 y la cuarta los 17 meses.	0.5 ml de vacuna reconstruida	Reacción anafiláctica post. a la administración de la vacuna, alergia a los componentes B, tosferina B, Fiebre de 38.5°C.
V. anti-tétanos del Cel. completo con toxoides difterico y tetánico	Inmunización activa de refuerzo contra difteria, tosferina y tétanos.	IM, R. deltoidea del brazo derecho.	Todos los niños de 4 años.	Refuerzo a los 4 años	0.5 ml	No aplicar en niños mayores de 6 años, 11 meses. Enf. neurológica progresiva.
Vacuna antineumocócica conjugada	Inmunización activa contra infecciones por Streptococcus pneumoniae.	IM, 2 de 18 meses en el tercio medio de la cara anterolateral del muslo derecho. Niños > de 18 meses en R. deltoidea del brazo.	2 a 59 meses de edad	3 dosis 2, 4 y 12 meses	0.5 ml	Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes de la fórmula.
V. anti-poliomielítica trivalente oral tipo Sabin	Para inmunización activa contra poliomielitis.	Oral	Niños < de 5 años Personas mayores de edad.	1 dosis adicional a partir de los 6 meses a 4 años.	0.4 ml = 1 dosis gota	Personas con inmunodeficiencia. - Bnt graves o px que reciben tx de corticoesteroides.
V. antineumocócica de 23 serotipos	Contra infección por Streptococcus pneumoniae.	IM, en R. deltoidea del brazo derecho.	Adultos de 65 años	Dosis única.	0.5 ml	Fiebre > de 38.5°C en personas con antecedentes de reacciones alérgicas a algún componente.
Toxoides tetánico y difterico adsorbidos, inactivos DT	Contra difteria y tétanos para niños 2 de 4 años que presenten contraindicación para recibir la vacuna por lo tanto se aplica en las vacunas.	IM, R. deltoidea del brazo derecho. Se debe aplicar en la cara anterolateral externa del muslo D.	Niños < de 4 años con contraindicaciones	Aplicar dosis DT hasta completar el esquema establecido.	0.5 ml	Puede haber fiebre y enf. graves. Personas con antecedentes de hipersensibilidad o reacción a la aplicación de una dosis previa.
V. de polisacáridos tetavalente contra enf. meningocócica de los serotipos 4B, C, Y y W135	Para prevenir la enf. causada por el meningococo de los serogrupos A, C, Y y W135.	Subcutánea en R. deltoidea.	De los 2 a 55 años	Dosis única	0.5 ml	Fiebre mayor a 38.5°C, con enf. grave, reacción alérgica severa a un componente de la vacuna.
V. tetravalente (SR, PU) contra sarampión, rubéola, tosferina y varicela	Prevención del sarampión y rubéola, parotiditis y varicela.	Via subcutánea, arco superior externo del triángulo del brazo izquierdo.	De 12 meses a 12 años	1ra dosis: 12-15 meses 2da dosis: 4-6 años	0.5 ml	Antecedentes de hipersensibilidad a algún componente de la vacuna o a principios activos que afectan al S. hematológico. Fiebre > 38.5°C.
V. anti-sarampión liofilizada	Inmunización contra sarampión.	Subcutánea, en el arco superior externo del triángulo del brazo izquierdo.	A partir de los 12 meses y 7 años	Das dosis	0.5 ml	Fiebre de 38.5°C, enf. graves o neurológicas, personas con leucemia, linfoma neoplásico o personas que reciben tx de corticoesteroides.
V. anti-rubéola liofilizada	Inmunización contra rubéola.	Subcutánea, en el arco superior externo del triángulo del brazo izquierdo.	En circunstancias de riesgo epidemiológico	Dosis única	A partir del año de edad.	No aplicar en mujeres embarazadas, personas con fiebre > a 38.5°C con inmunodeficiencias congénitas.
V. contra virus del Papiloma Humano	Para infecciones causadas por virus del Papiloma Humano.	IM, en la R. deltoidea del brazo derecho.	Niños de 9 años	Tres dosis 1. fecha elegida 2. a 1 mes 3. a 6 meses	0.5 ml	No aplicar a mujeres embarazadas y personas con hipersensibilidad a algún componente. No administrar en menores de 9 años.
V. anti-tifélica capsula, Bissacando U.	Inmunización contra la fiebre amarilla.	Subcutánea en R. deltoidea del brazo.	1 dosis y un refuerzo cada 10 años	Personas mayores de 9 meses	0.5 ml	hipersensibilidad a cualquier componente, inmunodeficiencia congénita o adquirida. Niños < de 9 meses.
V. combinada contra hepatitis A y B	Inmunización contra hepatitis A y B.	IM	A partir del año de edad	1-15 años: 2 dosis Adultos a partir de 16 años: 3 dosis	Pediatrica 0.5 ml A partir de 16 1 ml	Enf. grave o moderada, con o sin fiebre, reacción anafiláctica a dosis previas de la vacuna o a componentes de la vacuna.
Conjugada tetravalente enf. meningocócica meningitis (A, C, Y)	Para la prevención de N. meningitis del serogrupo C.	IM, R. deltoidea.	A partir de los 2 meses	2 a 12 meses: 2 dosis, cada 2 meses Adultos y adolescentes: 1 dosis única	0.5 ml	Fiebre mayor 38.5°C con enf. grave, reacción alérgica severa a algún componente de la vacuna.