



Cuadro comparativo

Cristian Josue Valdez Gomez

Esquema de vacunacion segun NOM-036-SSA2-2012

Parcial IV

Crecimiento y desarrollo

Dr. Jorge Lopez Cadenas

Medicina humana

Semestre III

Comitán de Domínguez, Chiapas, a 13 de Diciembre del 2024

Vacuna	Indicación	Vía de Administración	Grupo de Edad	Esquema	Dosis	Contraindicación
BCG	Prevención de formas graves de T.b (miliar y meníngea)	Intradérmica	Recién nacidos	Dosis Única	0.2 ml	Fiebre > 38.5°C Peso < 2 kg Inmunosupresión, VIH = automático
Hepatitis "B"	Prevención de la hepatitis B	I.M. intramuscular	Recién nacidos, Lactantes	Al nacer, 2x6 meses	0.5 ml	Alergia grave a componentes
Hexavalente	Prevención de difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, H. Influenzae, Hepatitis B	I.M. intramuscular	Lactantes y niños < 5 años	2, 4, 6 meses, refuerzo a los 18 meses	0.5 ml	Alergia grave a dosis previa, encefalopatía no explicada.
D.P.T.	Refuerzo vs difteria, tos ferina y tétanos	I.M. intramuscular	Niños > 4 años	Dosis única entre 4 - 6 años	0.5 ml	Reacción alérgica previa, enfermedad febril aguda
Rotavirus	Prevención de gastroenteritis grave por rotavirus	Oral	Lactantes < 8 meses	2 dosis: 2 x 4 meses 3 dosis: 2, 4, 6 meses	1.5 ml o 2 ml según Presentación	Malformaciones gastrointestinales Inmunodeficiencia
Antineumococo 13	Prev. enfermedad invasiva en grupos de riesgo	I.M. intramuscular	Lactantes y niños < 2 años	2, 4 y 12 meses	0.5 ml	Alergia grave a componente fiebre alta

Antineumo. coco. 23	Prev. Enfermedades invasivas en grupos de riesgo	Intramuscular IM	Adultos mayores Inmunocomprometidos	dosis única ref. 5 años	0.5 ml	Hipersensibilidad, embarazo
Salvin	Prev. de Poliomelitis	Oral	Niños < 5 años	Dosis adicional	2 gotas	Inmunosupresión, embarazo, enf. febril grave
SR (Sarampión y Rubéola)	Prev. Sarampión y Rubéola	Subcutánea	Niños 1-6 años	12 meses ref. 6 años	0.5 ml	Alergia grave a componentes, embarazo
Hepatitis "A"	Prevención Hep. "A"	IM Intramuscular	> 1 año	12 x 18 meses	0.5 ml	Alergia grave, embarazo
SRP	Prev. Sarampión, Rubeola y Parotiditis	Subcutánea	Niños 1 a 6 años	12 meses Ref. 6 años	0.5 ml	Alergia a comp. Embarazo, Inmuno deficiencia
Antirubeola	Prev. Rubéola	Subcutánea	Mujeres edad fertil	1 dosis en campanas	0.5 ml	Embarazo, fiebre alta, Inmuno sp.
VPH	Prev. Infección por VPH y CA Cervical	IM Intramuscular	Niñas y niños 9-14 años	0-6 meses 0, 2, 6 meses	0.5 ml	Alergia grave Embarazo
Anticólera	Prev. Cólera	Oral	> 2 años	2 dosis 1-6 sem.	1.5 ml	Alergia grave, enf. gastrointestinal
Antimalarica	Prev. malaria en viajeros zonas endémicas	Oral	Edades en Riesgo	Según regimen profiláctico	Según Regimen	Hipersensibilidad embarazo, Inf. Hepática severa

Bibliografía

Secretaría de Salud. (2012). NOM-036-SSA2-2012. Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos e inmunoglobulinas en el humano. Diario Oficial de la Federación. <https://www.dof.gob.mx>