



PASIÓN POR EDUCAR

cuadros comparativos

Jonathan Omar Galdámez Altamirano
Brayan Henry Morales López
Sexualidad Humana
3-A
Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre del 2024

DESARROLLO FETAL POR TRIMESTRE

	MESES	SEMANAS	CARACTERÍSTICAS
Trimestre I	1	Semana 3	el embrión parece un trozo de carne mide aproximadamente de.2cm
		semana 3 y 4	La cabeza se desarrolla de manera considerable, se comienza a desarrollar el sistema nervioso central y se puede observar los inicios de orejas y ojos
	2	Fin de semana 4	se construye la columna vertebral
		Semana 4 y 8	Se desarrollan las partes corporales externas ojos, orejas, mano, dedos, piernas y pies, se comienzan a formar las gónadas además de órganos como el hígado, pulmones, páncreas y riñones.
	3	Finales de la semana 10	El embrión ya tiene sus manitas acompañado de las uñas
		Semana 12	Ya se distingue el género del feto
		Finales de la semana 12	Crecimiento y diferenciación de las estructuras que rodean al feto, llegando a medir 10 cm y pesando 19 gramos

DESARROLLO FETAL POR TRIMESTRE

	MESES	SEMANAS	CARACTERÍSTICAS
Trimestre 2	4	Semana 14-15	Se puede detectar movimientos del feto
	5	final de la semana 18	La madre puede sentir los movimientos del feto y el médico ya es capaz de detectar el latido cardiaco fetal
		Semana 20	El feto abre los ojos por primera vez
	6	Semana 24	Ya es sensible a la luz, además de escuchar sonidos desde el útero y alterna períodos de vigilia y sueño
Trimestre 3	7	Final de la semana 27 y 30	La piel del feto ya es arrugadita y está cubierta de vello sedoso, se originan cúmulos de grasa bajo la piel, pierde el vello y se mueve con mayor intensidad
	8	Final de la semana 31-35	el crecimiento es más veloz y llega a pesar entre 2500-3800 gr
	9	Semana 36-39	El bebé a término ya logra pesar los 50 gr y esta en su completo desarrollo fetal

CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS POR TRIMESTRE

	CAMBIOS FÍSICOS	CAMBIOS PSICOLÓGICOS.
Trimestre 1 (las primeras 12 semanas)	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento en niveles hormonales: (Estrógeno y progesterona) producidos por la placenta • Las mamas se inflaman y hormiguean • Los pezones y areola pueden oscurecerse y ampliarse • Poliuria • nauseas matutinas • Repulsión hacia la comida o hacia su olor • Aumenten los exudados vaginales • Sentimientos de fatiga y sueño 	<ul style="list-style-type: none"> • Época de altas y bajas emociones. • Las mujeres embarazadas pasan de estar feliz a la depresión y el llanto, y de regreso Factores: <ol style="list-style-type: none"> 1. La actitud hacia el embarazo, si lo desea o no lo desea. 2. La clase social 3. Disponibilidad de apoyo social
Trimestre 2 (semanas 13 a 26)	<ul style="list-style-type: none"> • Movimientos del feto (avivamiento) • Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre • Estreñimientos y sangrados nasales • Edema sea un problema en cara, manos, muñecas, tobillos y pies • El calostro sale de los pezones 	<ul style="list-style-type: none"> • Periodo de calma y bienestar relativos. • Disminuye el temor del aborto espontaneo. • Menos probabilidad de depresión si la mujer tiene una pareja o esposo que cohabite con ella

CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS POR TRIMESTRE

	CAMBIOS FÍSICOS	CAMBIOS PSICOLÓGICOS.
Trimestre 3 (semanas 27 a 38)	<ul style="list-style-type: none"> • El útero ejerce presión sobre otros órganos, provocando incomodidad • Falta de respiración, por la presión en los pulmones • El estómago se oprime y la ingestión se vuelve común • El ombligo se ve empujado hacia afuera • El corazón, se encuentra bajo tensión a causa del aumento en volumen sanguíneo • Disminución de energía • El aumento de peso en mujeres delgadas debe subir. • En mujeres pesadas, debe haber disminución en los alimentos • útero se constriñe de manera dolorosa, (contracción de BRAXTAN HICKS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres embarazadas con apoyo social, tienen menor probabilidad de los sucesos estresantes, menor niveles de ansiedad e insomnio durante el tercer trimestre. • Mujeres embarazadas sin apoyo, surge mayores probabilidades de estrés, problemas psicológicos, y mayor probabilidad de que es bebé tenga un peso bajo al nacer

CUADRO COMPARATIVO

SIGNOS PRESUNTIVOS	SIGNOS PROBABLES	SIGNOS POSITIVOS
<ul style="list-style-type: none">• La amenorrea• sensibilidad de las mamas• náusea• cambios emocionales• Poliuria• Fatiga	<ul style="list-style-type: none">• pruebas de embarazo• prueba de inmunología• Radioinmunoanálisis beta-hCG• Signo de Chadwick: Coloración azulada de la vagina y el cuello uterino.• Signo de Hegar: Suavización del cuello uterino	<ul style="list-style-type: none">• latido del corazón• Movimiento fetal activo• Detección del esqueleto fetal por medio de ultrasonido.

BIBLIOGRAFÍAS:

**Hyde, J. S., & Delamater, J. D. (2006). Sexualidad humana (9. ed.).
McGraw-Hill Interamericana de México**