



Mi Universidad

Cuadro comparativo

Michelle Roblero Álvarez

Ramón de Jesús Aniceto Mondragón

Parcial II

Sexualidad Humana

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Medicina Humana

Tercer Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 6 de octubre de 2024

DESARROLLO FETAL					
Trimestre/Semanas de gestación	Primer trimestre	Segundo trimestre		Tercer trimestre	
<i>Tercera semana</i>	<p>Aspecto: pequeño trozo de carne.</p> <p>Tamaño: mide cerca de 2.0 cm (1/12 de pulgada).</p>	<i>Decimo cuarta semana</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se pueden detectar los movimientos del feto (avivamiento) El médico puede detectar el latido cardiaco (esto también ayuda al médico a determinar la longitud de la gesta 	<i>Vigésimo quinta y séptima semana</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel (lo que le da apariencia regordeta al feto) Se pierde el vello sedoso El feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza (si esta posición no ocurre al momento del parto habrá una presentación de nalgas)
<i>Cuarta semana</i>	<p>Durante la 3ra y 4ta semana se desarrolla:</p> <ul style="list-style-type: none"> La cabeza Se comienza a formar el sistema nervioso central Los inicios de los ojos y orejas <p>Finales de la 4ta sem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Columna vertebral (al inicio se puede observar una cola) 		<i>Vigésima semana</i>		<ul style="list-style-type: none"> El feto abre sus ojos por primera vez
<i>Cuarta a octava semana</i>	<p>Desarrollo completo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ojos Orejas Brazos Manos (incluyendo dedos) Piernas Pies (Inicio de los dedos de pies) 	<i>Vigésimo cuarta semana</i>	<ul style="list-style-type: none"> El feto es sensible a la luz Puede escuchar sonidos in útero Movimientos de brazos y piernas vigorosos Alternan entre periodos de vigilia y sueño La piel del feto está arrugada y cubierta de vello sedoso 	<i>Trigésima séptima a cuadragésima segunda semana</i>	<ul style="list-style-type: none"> Peso de el bebé a término: en promedio 3300 gramos (7.5 libras) Mide: 50 cm (20 pulgadas)
<i>Séptima semana</i>	<p>A finales se forman:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hígado Páncreas Pulmones Riñones Intestino Gónadas (aunque no se puede distinguir el género) <p>Todos han empezado a funcionar limitadamente.</p>				
<i>Décima semana</i>	<ul style="list-style-type: none"> Formación completa de los dedos de los pies Formación de uñas 				
<i>Duodécima semana</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se distingue el género del feto <p>Mide: cerca de 10 cm</p> <p>Pesa: 19 gramos</p>				

CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS

CAMBIO	<i>Primer trimestre</i>	<i>Segundo trimestre</i>	<i>Tercer trimestre</i>
<p><i>CAMBIOS FÍSICOS</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • elevado aumento en niveles hormonales, en especial de estrógeno y progesterona, producidos por la placenta. • Las mamas se inflaman y hormiguean. • Los pezones y el área que los rodea (areola) pueden oscurecerse y ampliarse. • necesidad de orinar con mayor frecuencia • náuseas matutinas, sentimientos de náusea, tal vez hasta llegar al vómito. • sentimientos de fatiga y sueño 	<ul style="list-style-type: none"> • concientiza de los movimientos del feto. • vientre en rápida expansión. • Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre. • periodo incluyen estreñimientos y sangrados nasales. • “edema” retención de líquidos e inflamación sea un problema en cara, manos, muñecas, tobillos y pies. • es posible que un delgado líquido amarillo o ámbar llamado calostro salga de los pezones, aunque todavía no hay leche. 	<ul style="list-style-type: none"> • el útero es muy grande y duro. • algunas mujeres no pueden conciliar el sueño a causa de sus maromas y eructos. • Hay presión sobre los pulmones, lo que puede causar falta de respiración. • El estómago también se oprime y la indigestión se vuelve común. • El ombligo se ve empujado hacia fuera. • El corazón se encuentra bajo tensión a causa del considerable aumento en volumen sanguíneo. • dolores de espalda. • contracciones de Braxton-Hicks. • descenso, aligeramiento o encajamiento.
<p><i>CAMBIOS PSICOLÓGICOS</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antojos. • náusea asociada con las náuseas matutinas y la fatiga. • depresión. • ansiedad. • preocupaciones acerca de un aborto espontáneo. • pasa de estar muy feliz a la depresión y el llanto, y de regreso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuye el temor de un aborto espontáneo. • Existen menos probabilidades de depresión. • los sentimientos de cuidado o de interés materno 	<ul style="list-style-type: none"> • menores niveles de ansiedad e insomnio. • menos sucesos vitales estresantes concurrentes.

SIGNOS PRESUNTIVOS PROBABLES Y CONFIRMATORIOS DEL EMBARAZO

<i>Signos presuntivos</i>	<i>Signos probables</i>	<i>Signos confirmatorios</i>
<ul style="list-style-type: none">• Amenorrea• Sensibilidad en las mamas• Náuseas	<ul style="list-style-type: none">• Prueba inmunológica basada en la detección de la presencia de hCG en la orina de la mujer (esta es secretada por la placenta).• Pruebas de laboratorio (98 a 99% precisas)• Radio inmunoanálisis beta-hCG (análiza la presencia de beta-hCG en una muestra de sangre)• Pruebas caseras de embarazo (pruebas diseñadas para detectar hCG en la orina).	<ul style="list-style-type: none">• Latido del corazón fetal• Movimiento fetal activo• Detección del esqueleto fetal por medio del ultrasonido

Referencia bibliográfica:

- I. Hyde, J. S. (2024). *Sexualidad humana* (7^a ed.). McGraw-Hill / Interamericana de México. Capítulo 7, Concepción, embarazo y parto, pp. 132-167.