



Reporte de practica

No. 1 Nombre de la practica: Administración de lidocaína
 Fecha: 08/11/2024 Grupo: B
 Nombre del alumno: Esmeralda Pérez Méndez

Describe el procedimiento, realiza conclusiones y adjunta imágenes de lo que realizaste durante la práctica.

Nombre del objeto: Conocer la correcta aplicación de la lidocaína



<p><u>Preparación: Lávate las manos y limpia la zona de inyección con un antiséptico (como alcohol).</u></p> <p><u>Aguja: Usa una aguja fina</u></p> <p><u>Inyección: Introduce la aguja en el tejido subcutáneo, cerca del área que necesitas anestésiar.</u></p> <p><u>Aplicación de lidocaína: Inyecta la lidocaína lentamente en pequeñas cantidades mientras retiras la aguja gradualmente.</u></p> <p><u>Espera a que haga efecto: Deja actuar la lidocaína entre 5 y 10 minutos.</u></p>	<p>1. <u>Bloqueo en anillo (bloqueo de dedo)</u></p> <p><u>Útil para anestésiar dedos completos sin afectar toda la mano.</u></p> <p>1. <u>Preparación: Limpia el dedo con antiséptico.</u></p> <p>2. <u>Puntos de inyección: Hay cuatro puntos alrededor de la base del dedo (a nivel del metacarpiano proximal):</u></p> <p><u>Inyecta en la superficie dorsal y luego en las superficies laterales (medial y lateral).</u></p>	<p>1. <u>Aplicación: Inyecta lidocaína en estos puntos en pequeñas cantidades sin presionar demasiado, ya que los tejidos en el dedo son sensibles.</u></p> <p>2. <u>Espera a que haga efecto: La anestesia puede tardar entre 5 y 10 minutos.</u></p> <p><u>Precauciones</u></p> <p><u>Dosificación: La dosis máxima de lidocaína sin epinefrina para adultos es de aproximadamente 4-5 mg/kg (no exceder 300 mg).</u></p>
---	---	---