

Reporte de practica

No. 1 Nombre de la practica: Bloqueo Regional
 Fecha: 7 de noviembre del 2024 Grupo: 3 B
 Nombre del alumno: Ángel Antonio Suárez Guillén

Objetivo:

Lograr una anestesia eficaz y segura en el dedo afectado para permitir la realización de procedimientos que se requieran para anestesiar un dedo. Asimismo como también verificar la respuesta que tenga el dedo ante el anestésico aplicado, así como también posibles efectos adversos.

Materiales:

Para la práctica hemos utilizado diferentes instrumentos para anestesiar

- lidocaína en frasco
- lidocaína en ungüento
- jeringas de insulina
- torundas
- Alcohol



Procedimientos:



Paso #1: Lavado de manos



Paso #2: Colocar alcohol con la torunda a la persona ha anestesiar.



Paso #3: Colocar el ungüento de lidocaína en el dedo ha anestesiar, de forma que la lidocaína abarque las dos partes del dorso del dedo.



Paso #4: Al cabo de unos minutos de poner el ungüento, pasaremos a inyectar en una parte del dorso del dedo



Paso #5: Inyectar la otra parte del dorso faltante



Paso #5: Limpiar sangre provocada por la inyección



Paso #6: Observar el dedo, esperando ver rubor y calor, la persona a los minutos sentirá parestesias.



Paso #7: Tener en observación las siguientes horas al paciente anestesiado, por efectos secundarios como alegrías.

Conclusiones:

Llegando a la conclusión de esta práctica hecha, los efectos anestésicos en los dedos tienen un tiempo de acción relativamente corto y una sensación rara. La utilización de anestésicos locales en regiones como los dedos, es una práctica segura, siempre cuando se sigan paso a paso los procedimientos para una inyección segura. Los anestésicos locales usados en este tipo de partes del cuerpo, se usan ayormente para procedimientos menores, como por una herida o sutura que arreglar en el dedo, a mayores cantidades de anestésico, dependerá de su tiempo de acción.