

UDS



Dayra Azucena Márquez Cruz

Farmacología

Dr. Dagoberto Silvestre Esteban

Medicina Humana

Tercer semestre "B"

Reporte de práctica sobre el bloqueo regional digital

Comitán de Domínguez, Chiapas a 05 de Noviembre del 2024.

Reporte de práctica

No. 01 Nombre de la Bloqueo regional digital
 practica:

Fecha: 04 de Noviembre del 2024 Grupo: 3° "B"

Nombre del Dayra Azucena Márquez Cruz
alumno:

Objetivo:

Realizar un adecuado bloqueo regional digital en el dedo medio, haciendo énfasis en la localización de la inyección.

Materiales:

- Lidocaína al 2%
- Lidocaína en ungüento
- Jeringa de 5 ml
- Jeringa de insulina
- Torundas de alcohol
- Guantes

Procedimiento:

Paso 1.

Lavado correcto de manos, con agua y jabón importante para evitar la contaminación en el lugar de inyección.

Paso 2.

Identificar al paciente y notificarles los procedimientos que se le realizaran.

Paso 3.

Preparar los materiales para su uso, cargar con la jeringa de 5 ml con la lidocaína del 2% y hacer el cambio de aguja por una de insulina. Calculamos la dosis del paciente con forme a su peso por dosis máxima entre 20 mg.

Paso 4

Desinfectar el área de infiltración con torundas de alcohol.

Paso 5

Aplicación de lidocaína en ungüento.

Paso 6

Sostener la jeringa con el anestésico local en un ángulo superficial a la piel.

Paso 7

Insertar la aguja en forma directa en la capa subdérmica expuesta.

Paso 8

Aspirar para verificar que no se dé la colocación intravascular.

Paso 9

Inyectar con lentitud el anestésico local, mientras retiramos la aguja se repite el paso del otro lado del dedo.

Paso 10


Esperamos unos minutos para verificar que haga efecto nuestro anestésico local, se puede dar un masaje para facilitar la distribución del anestésico.

Paso 11

Verificamos que el paciente no tenga un efecto adverso en la aplicación.

Conclusiones:

En este reporte de práctica concluimos que el bloqueo regional digital nos ayuda en diferentes ocasiones y nos permite dar un bloqueo nervioso en alguna extremidad en este caso los dedos de las manos, durante la práctica experimentamos lo que es tener ese bloqueo, así mismo damos por hecho una buena aplicación con lidocaína al 2%.



Bibliografía:

Brunton, L.L., Knollmann, B. C. Hilal-Dandan, R.(EDS) 2019. Goodman y Gilman: Las bases farmacológicas de la terapéutica (13 edición). Mcgraw-Hill educación.