



Mi Universidad

Cuadros comparativos

Breici del Rocío López Méndez

Daniel Esteban Hernández Méndez

Parcial II

Sexualidad humana

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Licenciatura en Medicina Humana

Tercer semestre, grupo B

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de octubre de 2024

CUADRO COMPARATIVO: DESARROLLO FETAL



SEMANAS

TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3
<p>Tercera semana:</p> <ul style="list-style-type: none"> El embrión tiene aspecto de trozo de carne El embrión mide cerca de 0.2cm 	<p>Decimo decima semana</p> <ul style="list-style-type: none"> La gestante puede sentir los movimientos del feto Los latidos cardiacos son audibles 	<p>Inicio del tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se forma deposito de grasa debajo de la piel Se pierde vello sedoso
<p>Tercera y cuarta semana</p> <ul style="list-style-type: none"> La cabeza se desarrolla de manera considerable Se comienza a formar el sistema nervioso central Se pueden observar los inicios de los ojos A finales de la cuarta semana se construye la columna vertebral Se puede observar una "cola" 	<p>Vigésima semana</p> <ul style="list-style-type: none"> El feto abre los ojos por primera vez 	<p>25-28 semanas (7 mes)</p> <ul style="list-style-type: none"> El feto rota dentro del útero El feto asume la posición de la cabeza
<p>Cuarta semana a la octava semana</p> <ul style="list-style-type: none"> Se desarrollan partes corporales externas: ojos, orejas, brazos, manos, piernas, pies y dedos de los pies En la octava semana la estructura en forma de cola desaparece. 	<p>Vigésimo cuarta semana</p> <ul style="list-style-type: none"> El feto es sensible a la luz Puede escuchar sonidos in útero Tiene movimientos de extremidades de manera vigorosa Alterna entre periodos de vigilia y sueño 	<p>Ultimos 2 meses (31-40 semanas)</p> <ul style="list-style-type: none"> Crecimiento veloz Al final del octavo mes pesa entre 2,500 gramos Finales del tercer trimestre, el bebé promedio pesa 3,300 gramos <ul style="list-style-type: none"> Mide 50cm
<p>Séptima semana (finales)</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha formado el hígado, páncreas, riñones e intestino, han empezado a funcionar de manera limitada. Se han formado las gónadas, pero el genero no se puede definir hasta la duodécima semana. 	<p>Final de segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> La piel del feto arrugada y cubierta de vello sedoso 	
<p>Duodécima semana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mide cerca de 10cm Pesa aproximadamente 19g 		

CUADRO COMPARATIVO			
CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATERNOS			
TRIMESTRE I (primeras 12 semanas)			
Cambios físicos		Cambios psicológicos	
		Según la perspectiva	
Elevado aumento en niveles hormonales	Principalmente Estrógeno y progesterona	Periodo de felicidad y calma	Época de altas y bajas emocionales
	Inflamación y hormigueo de las mamas	La mujer embarazada pasa de estar muy feliz a la depresión y el llanto, y de regreso	
	Desarrollo de las glándulas mamarias	“el embarazo no es ni una época de bienestar intenso ni de tumulto emocional exacerbado”	
Comúnmente	Los pezones y la areola se oscurecen y se amplían	Striegel-Moore <i>et al.</i> , 1996	
	Aumenta frecuencia de micción		
Náuseas matutinas que pueden conducir a la emesis y repulsión a la comida (presente en el 75% de las pacientes)		Factores a considerar	
Possible	Aumento de los exudados vaginales	a) Las mujeres que desean el embarazo se encuentran menos ansiosas que las mujeres que no lo desean	
	Cambia el pH de la vagina	b) Clase social	
		c) Disponibilidad de apoyo social	
Sentimiento de fatiga y sueño	Secundario a	Efecto sedante de progesterona	Durante este trimestre las ansiedades de las mujeres se centran alrededor de preocupaciones acerca de un aborto espontáneo.
TRIMESTRE II (semanas 13 a 26)			
Cambios físicos		Cambios psicológicos	
	Avivamiento: La mujer se concientiza de los movimientos del feto	Segundo trimestre considerado como periodo de calma y bienestar relativos	
	Vientre en rápida expansión y aumento de peso	Disminuye el temor de un aborto espontáneo	Producto de Movimientos del feto
	Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre	La disponibilidad de apoyo social disminuye las probabilidades de la aparición de la enfermedad	
	Aparecen estreñimientos y sangrados nasales	Aumenta angustia en mujeres con embarazos anteriores	

Possible edema en cara, manos, muñecas, tobillos, pies	Aparecen influencias culturales sobre el comportamiento durante el embarazo
A la mitad del embarazo las mamas completan su desarrollo para el amamantamiento	
Calostro saliendo de los pezones en 19na semana	
TRIMESTRE III (semanas 27 a 38)	
Cambios físicos	Cambios psicológicos
Útero es muy grande y duro	Incremento de los cambios psicológicos mencionados en el trimestre II
Aumenta actividad del feto	El bienestar psicológico es mayor entre aquellas mujeres que cuentan con un apoyo social
Insomnio a causa de maromas y eructos	Madres primerizas informaban de un aumento significativo en la inconformidad con sus maridos del segundo al tercer trimestre
Incomodidad a otros órganos producto de volumen del útero	
Puede aparecer dificultad respiratoria	
Comúnmente aparición de indigestión	
Ombigo empujado hacia el exterior	
Aumento de la frecuencia cardiaca	
Disminución de energía	
Continúa aumento de peso	El intercambio de afecto entre parejas disminuye los niveles de ansiedad e insomnio durante este trimestre
Equilibrio ligeramente alterado	
Aparece caminado de "pato"	
Aparecen contracciones de Braxton-Hicks	
De dos a cuatro semanas antes del nacimiento aparece el encajamiento, sucede en el primer embarazo.	
Mientras que para las pacientes quienes ya han tenido hijos este proceso ocurre en el trabajo de parto.	

CUADRO COMPARATIVO				
EMBARAZO				
Signos presuntivos		Signos probables		Signos confirmatorios
Amenorrea		Persistencia de amenorrea		Latido del corazón fetal
Sensibilidad de las mamas		Signo de Chadwick Coloración violácea de las paredes vaginales		
Náuseas		Cambios en útero Cérvix blando Útero aumentado de volumen Cambio en la forma uterina Cambio de consistencia uterina		
Por sistemas				
Digestivo	Náuseas, vómitos, sialorrea, estitiquiez			
Nervioso	Somnolencia, irritabilidad, labilidad emocional, insomnio, fatigabilidad, apetito caprichoso, aversión a ciertos olores			Movimiento fetal activo
Urinario	Polaquiuria	Crecimiento uterino 12 semanas Palpable		
Mamas	Tensión, sensibilidad, calostro, corpúsculos de Montgomery, pigmentación pezón y areola, red venosa aumentada, estrías	15 semanas Punto intermedio entre ombligo y sínfisis		
Abdomen	Aumento de volumen, línea parda, aumento de vello	20 semanas En el ombligo, mide 20 cm		
Extremidades pélvicas	Dilatación venosa, várices	Entre las semanas 18 y 32 hay concordancia entre las SDG y la altura uterina		Detección del esqueleto fetal mediante ultrasonido

Pruebas	Momento para realizarla
hCG en sangre	Detectable de los 7-9 días después de la fertilización
hCG en orina	Demora aproximadamente 5 días más en detectarla, arroja resultados desde los 14 días postfecundación

Bibliografía

Janet Shibley Hyde y John D. DeLamater. Sexualidad humana (9ª edición) 2006. Recuperado el 11 de octubre de 2024.

Hernán Rubilar Feris. (2016). Tratados de Ginecología y Obstetricia. Diagnóstico de Embarazo. Síntesis de Conocimientos. Biblioteca para estudiantes y profesionales de la salud. Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Recuperado el 11 de octubre de 2024.