



## Cuadro comparativo

Jorge Santis García

Segundo parcia

Sexualidad humana

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Medicina humana

Tercer semestre grupo "B"

	<b>Semanas y mes</b>	<b>Desarrollo fetal</b>
<b>Primer trimestre</b>	Primera y segunda semana	Célula implantada del útero se convierte en un embrión.
	Tercera semana de gestación	El embrión parase un pequeño trozo de carne, mide cerca de 0.2 cm. (1/12 pulgadas).
	Tercera y cuarta semana	La cabeza se desarrolla de manera considerable, se comienza a forma el sistema nervioso central, puede observar el inicio del ojo y oreja, la columna vertebral se construye para finales de la cuarta semana, al inicio del embrión se puede observar una cola, esto se desaparece para la octava semana.
	Cuarta y octava semana	Se desarrolla las partes corporales externas; ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies, dedos de los pies, final de la décima semana no solo tiene un conjunto completo de dedos, sino que también tiene uñas, finales de la séptima semana se han formado, se forma el hígado, pulmones, riñones, e intestino y ha empezado funciona de manera limitad, se forma las gónadas, el género del feto no se puede distinguir cono claridad si no hasta la duodécima semana.
	Final de la duodécima semana.	al final de la duodécima semana el feto es indudablemente humano y parece un pequeño lactante y a partir de este momento, el desarrollo consiste principalmente del crecimiento y diferenciación de estructuras que ya se encuentran presente
<b>Segundo trimestre</b>	Final de la décima cuarta semana	Se puede detectar los movimientos del feto (avivamiento)
	Decimoctava semana	La mujer ha podido sentir los movimientos durante dos o cuatro semana, y el medico puede detectar el latido cardiaco del feto.
	Vigésima semana	El feto abre sus ojos por primera vez.
	Aproximadamente para la vigésima cuarta semana.	Es sensible a la luz y puede escuchar sonido in útero, en este momento, los movimientos de brazo y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño.
	Al final del segundo trimestre	La piel del feto esta arrugada y cubierta de un bello sedoso,
<b>Tercer trimestre</b>	Principio del tercer trimestre	Se forma deposito de grasa por debajo de la piel; esto le darán al lactante la característica apariencia regordeta de los bebes, se pierde el bello sedoso.
	Durante el séptimo mes	El feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza, si esta rotación no ocurre para el momento del parto, habrá una presentación de nalgas.
	Final de la octava semana	El crecimiento del feto es veloz, pesa en promedio de 2500 gramos (5 libras, 4 onzas), el bebé promedio a termino pesa 3300 gramos (7.5 libras) y mide 50 centímetros (20 pulgadas.)

**TRIMESTRES  
DEL  
EMBARAZO**

**Cambios físicos**

**Cambios fisiológicos**

<p><b>Primer trimestre</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un elevado aumento en niveles hormonales (estrógeno y progesteronas) producido por la placenta.</li> <li>✓ Las mamas se inflaman y hormiguean (causa de las glándulas mamarias, estimulado por la hormona)</li> <li>✓ Los pezones y el área que los rodea (areola) pueden oscurecerse y ampliarse.</li> <li>✓ Orinar con mayor frecuencia (se relaciona con los cambios de las hormonas pituitarias que afecta las suprarrenales).</li> <li>✓ El útero en crecimiento también contribuye al presionar en contra la vejiga</li> <li>✓ Experimentan náuseas matutinas tal vez hasta llegar a vomitar.</li> <li>✓ Aumente los exudados vaginales</li> <li>✓ Los sentimientos de Fatiga y sueño probablemente se relacionan con los niveles elevados de progesterona. Tiene un efecto sedante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Según el punto de vista, se supone que el embarazo es un periodo de felicidad y calma.</li> <li>✓ Y el otro punto de vista el embarazo es una época de altas y bajas emocionales</li> <li>✓ Las mujeres que deseen el embarazo se encuentran ansiosas que las mujeres que no lo deseen.</li> <li>✓ Y el otro factor es la clase social.</li> <li>✓ La disponibilidad del apoyo social.</li> <li>✓ Que estén experimentando otros vitales estresantes:</li> <li>✓ Es frecuente la ansiedad de las mujeres se preocupen acerca de un aborto espontaneo.</li> </ul>
<p><b>Segundo trimestre</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La mujer se concientiza de los movimientos del feto (avivamiento) una experiencia muy emocionante.</li> <li>✓ Su vientre es rápida expansión</li> <li>✓ Desaparece la mayoría de los síntomas físicos del primer trimestre (tales como náuseas matutinas y las incomodidades se minimizan).</li> <li>✓ Estreñimiento</li> <li>✓ Sangrado (ocasionado por el aumento del volumen del volumen sanguíneo)</li> <li>✓ Edema, retención de líquidos e inflamación (cara, manos, muñecas, tobillos, y pies, proviene de una mayor retención de líquido en todo el cuerpo).</li> <li>✓ Las mamas a causa de la estimulación hormonal, esencialmente ha completado su desarrollo,</li> <li>✓ Comienza en la decimonovena semana, posible que un delgado líquido amarillo o ámbar llamado (<b>calostro</b>) salga a los pezones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disminuye el temor de un aborto espontaneo</li> <li>✓ Existe menos probabilidad de depresión durante el segundo trimestre si la mujer tiene una pareja o esposo que cohabite con ella.</li> <li>✓ Las mujeres que han tenido embarazos anteriores se encuentran más angustiadas durante esta época que las mujeres que no han tenido.</li> </ul>
<p><b>Tercer trimestre</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El útero es grande y duro</li> <li>✓ La mujer percata de su tamaño y del tamaño del feto (se está volviendo cada vez más activo)</li> <li>✓ Algunas mujeres no pueden conciliar el sueño a causa de sus gases y eructos.</li> <li>✓ El tamaño extremo del útero ejerce presión a otros órganos.</li> <li>✓ Aumento de peso del segundo trimestre continua</li> <li>✓ En ocasiones el útero se constriñe de manera dolorosa (es llamada <b>contracción de Braxton-Hicks</b>).</li> <li>✓ El primer embarazo, aproximadamente de dos a cuatro semanas antes del nacimiento, él bebe rota y la cabeza desciende a la pelvis, esto se denomina (<b>descenso, aligeramiento o encajamiento</b>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El bienestar psicológico es mayor entre aquellas mujeres que cuentan un apoyo social</li> <li>✓ Mujer embarazada que tuvo un menor apoyo durante el embarazo hay una probabilidad de tener bebés con bajos peso al nacer.</li> </ul>

## CLASIFICACIÓN DE SIGNOS DE EMBARAZO

### Signos presuntivos

- la amenorrea
- sensibilidad de las mamas,
- náuseas.
- Vómitos
- Un pequeño aumento de la micción
- Fatiga
- Cambios en los genitales cambios de las mamas
- Cambios en el flujo vaginal



### Probables

- Falta de menstruación
- Sensación e hinchazón de los senos
- Náuseas y vómitos
- Aumenta la frecuencia de micción
- Dolor de la parte baja del abdomen
- Sensación de abdomen distendido
- Aversión a sabores u olores comunes
- Manchado también conocido como falsa regla
- Secreción de calostro
- Pruebas caseras



### Confirmatorios del embarazo

- Agrandamiento del útero.
- Prueba en la sangre para detectar la presencia de la gonadotropina coriónica humana.
- Ya cuando llega la paciente con un resultado de ultrasonidos
- Cuando hay latidos cardiacos
- Cuando hay movimiento fetal activo.



## Referencia bibliográfica

1.- Hyde, J. S., De Lamater, J. D., & Bari, S. M. O. (2007). *Sexualidad humana*. McGraw-Hill Interamericana.