



Diagrama de flujo

Montserrat Juvenalia Guzmán Villatoro

Angel Adiel Villagomez Gomez

Tercer Parcial

Materia: Sexualidad humana

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Medicina Humana

Tercer Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas. A 11 de octubre de 2024

DESARROLLO FETAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE



SEMANA



INCREMENTO



SEMENA 3

El embrión parece un pequeño trozo de carne y mide cerca de 0.2 centímetros (1/12 de pulgada)



SEMANA 4

Se comienza a formar el vicioso central y se pueden observar los incios de ojos y orejas

Se comienza a formar el vicioso central y se pueden



SEMANA



INCREMENTO



SEMANA 7

se han formado el hígado,
pulmones, páncreas, riñones e
intestino



SEMANA 12

Es indudablemente humano y
parece un pequeño lactante.
Mide cerca de 10 centímetros
(4 pulgadas) y pesa
aproximadamente 19 gramos
(2/3 de onza).

DESARROLLO FETAL DURANTE EL SECUNDO TRIMESTRE



SEMANA



INCREMENTO



SEMANA 11

Se pueden detectar los movimientos del feto (avivamiento)



SEMANA 18

Se detecta el latido cardiaco del feto



SEMANA 20

movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el



DESARROLLO FETAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE



SEMANA



INCREMENTO



SEMANA 28 A LO

Rotación fetal para preparar el parto La piel del feto está arrugada y cubierta de un vello sedoso.



EL PRIMER TRIMESTRE (LAS PRIMERAS 12 SEMANAS)

ASPECTO

CAMBIOS FÍSICOS

CAMBIOS PSICOLÓGICOS

PRIMEROS SÍNTOMAS

Ausencia de menstruación, aumento en la frecuencia de micción, sensibilidad en mamas, náuseas, vómitos.

Emociones variadas, desde felicidad por el embarazo hasta ansiedad o miedo, dependiendo de la situación.



CAMBIOS HORMONALES

Aumento en los niveles de estrógeno y progesterona, lo que provoca sensibilidad mamaria y oscurecimiento de pezones y areola.

Las hormonas también afectan el estado emocional, contribuyendo a la fatiga, cambios de humor, entre otros.



SISTEMA URINARIO

Necesidad frecuente de orinar debido al crecimiento del útero y cambios hormonales que afectan el balance de líquidos.

Posible ansiedad o preocupación relacionada con los cambios físicos y nuevas responsabilidades.



SISTEMA

Náuseas matutinas (pueden ocurrir en cualquier momento del día), vómitos, aversión a ciertos

En mujeres que no esperaban el embarazo, pueden aparecer sentimientos de incertidumbre o



EL PRIMER TRIMESTRE (LAS PRIMERAS 12 SEMANAS)

ASPECTO

CAMBIOS FÍSICOS

CAMBIOS PSICOLÓGICOS

DESEO DEL EMBARAZO

Las mujeres que desean el embarazo experimentan menos ansiedad en relación con los cambios físicos.

La actitud hacia el embarazo influye en el estado emocional: las que lo desean tienen menos estrés.

PRUEBAS DE EMBARAZO

Sensibilidad mamaria, náuseas y micción frecuente son signos comunes en las primeras etapas.

La confirmación del embarazo puede generar emociones intensas de felicidad o preocupación, según el contexto.



EL SEGUNDO TRIMESTRE (SEMANAS 13 A 26)

- **Movimientos del feto (avivamiento):** Durante el cuarto mes, la mujer empieza a notar los movimientos del bebé, lo que aumenta su conciencia sobre el embarazo.
- **Expansión del vientre:** La mujer experimenta un crecimiento rápido del vientre, lo que provoca diversas reacciones emocionales. Algunas disfrutan del símbolo de feminidad, mientras que otras pueden sentirse incómodas con su figura.
- **Desaparición de síntomas del primer trimestre:** Las náuseas matutinas y otros malestares tienden a reducirse, pero pueden aparecer nuevos problemas como estreñimiento, sangrados nasales y edema

- **Calma relativa:** El segundo trimestre suele ser más tranquilo en comparación con el primero, ya que las molestias físicas disminuyen.

Disminución del temor al aborto espontáneo: Al notar los movimientos fetales, la preocupación por la posibilidad de un aborto disminuye.

Impacto del apoyo social: Las mujeres que cohabitan con una pareja o esposo experimentan menos probabilidades de depresión.

Ansiedad en mujeres con embarazos previos: Aquellas con hijos anteriores pueden sentirse más angustiadas

EL TERCER TRIMESTRE (SEMANAS 27 A 38)

- .Crecimiento del útero: El útero es muy grande y duro, lo que ejerce presión sobre los órganos internos. Esto causa incomodidades como falta de respiración y problemas digestivos (indigestión).
- .Aumento de peso: El incremento de peso continúa. Se espera que las mujeres ganen entre 25 y 35 libras durante todo el embarazo. Un aumento excesivo puede generar complicaciones, como hipertensión y tensión cardíaca.
- .Modificación del equilibrio: El peso añadido en la parte frontal del cuerpo puede afectar el equilibrio, provocando el característico caminar "de pato" y dolores de espalda.
- Contracciones de Braxton-Hicks: Son

- Apoyo social: El bienestar psicológico es mayor entre mujeres con apoyo social, mayor ingreso económico y menos eventos estresantes concurrentes.

Relaciones con el cónyuge: Las madres primerizas pueden experimentar mayor inconformidad con sus maridos durante el tercer trimestre, en comparación con el segundo

Intercambio de afecto: Las mujeres que reportan un mayor intercambio de afecto con su pareja experimentan mayor satisfacción emocional durante este periodo.

Preocupación por la actividad física: Algunas mujeres se preocupan por la cantidad adecuada de actividad física,

SIGNOS PRESUNTIVOS, PROBABLES, Y CONFIRMATORIOS DEL EMBRAZO,

Tipo de signo

Características

Presuntivo

- Náuseas y vómitos matutinos
 - Fatiga o cansancio
- Cambios en los senos (aumento de sensibilidad o dolor)
- Aumento en la frecuencia urinaria
- Ausencia de menstruación (amenorrea)

Probables

- Agrandamiento del abdomen
- Cambios en la forma y tamaño del útero
- Prueba de embarazo positiva (análisis de orina o sangre para detectar HCG)
- Contracciones de Braxton Hicks
- Hiperpigmentación de la piel

Confirmatorios

- Latidos fetales audibles
- Visualización del feto a través de ultrasonido
- Palpación de los movimientos fetales por parte de un profesional de salud
- Evidencia radiológica del esqueleto fetal

Referencias

Porth. Fisiopatología Grossman. Sheila & Mattson Porth. Carol •