



UDS

Mi Universidad

Priscila Monserrat Molina

Cuarto parcial

Crecimiento y Desarrollo

Dr. Jorge Cárdenas

Medicina huma

Tercer semestre, grupo "C"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 08 de diciembre del 2024

Vacuna	Indicación	Vía de administración	Grupo de edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
BCG	Prevención de tuberculosis y meningea	Intradérmica	Recien nacidos (<1 año preferentemente)	una sola dosis al nacimiento	0.05 ml (<12 meses) 0.1 ml (>12 meses)	Inmunodeficiencia lesiones cutáneas generalizadas Fiebre, PcooL2 H9
Hepatitis B	Prevención de hepatitis B	Intramuscular (cara anterolateral del muslo)	Recien nacidos y lactantes	3 dosis (0, 2, 6 meses)	0.5 ml	Hipersensibilidad a componentes de la vacuna
Pentavalente	Prevención de difteria, tos ferina, tétanos, Poliomielitis y H. Influenza tipo b	Intramuscular	<5 años	4 dosis (2, 4, 6, 18 meses)	0.5 ml	Enfermedad febril grave alergia severa a componentes
DPT	Refuerzo para difteria, tos ferina y tétanos	Intramuscular	Niños de 4 años	una dosis	0.5 ml	enfermedad febril grave alergia severa a componentes
Rotavirus	Prevención de gastroenteritis por rotavirus	oral	Lactantes menores de 8 meses	2-3 dosis según tipo de vacuna (2, 4, 6 meses)	1, 5, 2 ml	Malformaciones digestivas Invasión intestinal Prevención enfermedades febril grave
Neumococica conjugada	Prevención de infecciones neumococicas	Intramuscular	>5 años y adultos mayores (>60 años)	3 dosis (<1 año 2, 4 y 12 meses) Refuerzo en mayores de 60 años	0.5 ml	Hipersensibilidad a componentes o dosis previas
Influenza	Prevención de Influenza	Intramuscular	Niños de 6-59 meses Embarazadas > 60 años	anual (2 dosis iniciales con intervalo de 1 mes en <9 años)	0.5 ml	Alergia grave al huevo o al huevo de gallina Dalle en los últimos 6 meses

Vacuna	Indicación	Vía de administración	Grupo de edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
Varicela	Prevención contra la varicela	Subcutánea	Niños 12 meses y adultos susceptibles	1-2 dosis seguridad (a partir de los 12 meses)	0.5 ml	Embarazo Inmunodeficiencia alergia severa a componentes
SRP (Triple viral)	Contra Prevención de Sarampión Rubéola Paratiditis	Subcutánea	Niños de 1 año y 6 años	2 dosis (12 meses y 6 años)	0.5 ml	Embarazo Inmunodeficiencia alergia severa a componentes (gelatina, neomicina)
Td (Tetanos difteria)	Prevención contra difteria, tetanos y tos ferina	Intramuscular	>7 años embarazadas (3er trimestre)	Cada 10 años	0.5 ml	Reacción alérgica severa a componentes o dosis previas
Tdap (Embarazadas)	Prevención contra difteria, tetanos y tos ferina	Intramuscular	Mujeres embarazadas (>20 semanas de gestación)	una dosis en cada Embarazo	0.5 ml	Reacción alérgica severa a componentes
Antirabica	Exposición al virus de la rabia	Intramuscular Intradermica	En todas las edades	Pre (3 dosis) y post-exposición (2 dosis según esquema)	1 ml (1m) 0.1 ml (10)	Hipersensibilidad grave a componentes

Producto	Indicación	Vía de administración	Dosis	Contraindicaciones
Fáboterapico polivacante	Mordeduras de serpientes venenosas	intravenoso (IV)	según la gravedad y el peso	Hipersensibilidad conocida al producto
Fáboterapico antiracido	Mordeduras de alacranes venenosos	intramuscular o intravenoso	Dosis única o fraccionada	Ninguna absoluta observar posibles reacciones alérgicas
Inmunoglobulina antitetánica	Heridas profundas y sucias no vacunados o con esquema incompleto	intramuscular	250 UI (dosis única)	Hipersensibilidad a proteínas humanas
Inmunoglobulina antirabica	Profilaxis postexposición al virus de rabia	infiltración en la herida y IM	20 UI/kg	Ninguna absoluta evaluar alérgicas