



Mi Universidad

Esquema de vacunación

Andrea Alejandra Albores López

Parcial IV

Crecimiento y desarrollo

Dr. Jorge López Cadena

Licenciatura en medicina humana

Tercer semestre grupo "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 08 de diciembre de 2024

Vacuna	Indicación	Vía de administración	Grupo de edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones.
Vacuna BCG (M. bovis)	Prevención de tuberculosis meningea y miliar	Intradérmica (brazo derecho)	Recién nacidos hasta 5 años de edad	única	0.1 ml	Peso menor a 2 kg, fiebre, inmunosupresión
Hepatitis B (HBs Ag)	Prevención de hepatitis B	Intramuscular	Recién nacidos y menores de 18 años	0, 2, 6 meses	0,5 ml menores 1 ml mayores	Reacción grave a dosis previa, alergia a componentes de la vacuna.
Hexavalente acelular	Prevención de difteria, tos ferina, tétanos, polio, Haemophilus influenzae B y HB	Intramuscular	2, 4, 6 y 18 meses	4 dosis	0,5 ml	Enfermedad neurológica progresiva, fiebre alta, alergia a componentes
DPT	Refuerzo contra difteria, tos ferina, tétanos	Intramuscular	4 años	Única	0,5 ml	Enfermedad neurológica progresiva, reacción severa a dosis previa.
Rotavirus	Prevención de gastroenteritis grave	Oral	2, 4 y 6 meses	2-3 dosis según su fórmula	1,5 - 2 ml según fórmula	Malformaciones intestinales, antecedentes de intussuscepción intestinal, alergia grave a componentes
Antineumocócica conjugada.	Prevención de infecciones por neumococo	Intramuscular	2, 4, 6, 12 y 18 meses	4 dosis	0.5 ml	Reacción alérgica grave a dosis previa

Vacuna	Indicación	Vía de administración	Grupo de edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones.
Influenza	Prevención de gripe	Intramuscular	Desde los 6 meses y el año	Anual	0,25 - 0,5 ml, según edad	Alergia al huevo, Fiebre alta, menores de 6 meses
Antipolio (SABIN)	Prevención de la poliomielitis	Oral	6 meses a 5 años	Única	2 gotas	Inmunodeficiencia, reacción grave a dosis previa
SR (Doble viral)	Prevención de sarampión y rubéola	Subcutánea	mayores de 12 meses	Única	0.5 ml	Inmunosupresión, alergia al huevo o neomicina.
Antineumocócica 23 serotipos	Prevención de infecciones por neumococos	Intramuscular	Mayores de 60 años o riesgo	Refuerzo cada 5 años	0,5 ml	Reacción grave a dosis previa
Hepatitis A (VHEPA)	Prevención de la Hepatitis A.	Intramuscular	Desde los 12 meses	2 dosis	0.5 ml	Reacción alérgica grave
Tetraviral (SRP + Varicela)	Prevención de sarampión, rubéola, Parotiditis y Varicela	Subcutánea	1 año y 6 años	2 dosis	0.5 ml	Inmunosupresión, alergia al huevo.

Vacuna	Indicación	Vía de administración	Grupo de edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
Anti-Rubeola	Eliminación de rubeola	Subcutánea	Mujeres de 12 a 34 años	Único	0,5 ml	Inmunosupresión alergia al huevo
VPH tetravalente/bivalente	Prevención de infecciones por VPH	Intramuscular	niños de 9 a 14 años	2 dosis	0.5 ml	Reacción alérgica
Anti-cólera inactivado	Prevención del cólera	oral	A partir de 1 año en zonas de riesgo	2 dosis	3ml adultos 1.5ml niños	Enfermedad aguda severa
Antimalárica	Prevención de la malaria	Intramuscular o subcutánea	5 meses	4 dosis	Variable según su fórmula	Alérgicos a componentes

Esquema de vacunación - NOM - 036 - SSA2 - 2012

- Andrea Alejandra Albores López
- Crecimiento y desarrollo

Tercer semestre grupo "C"

08 - Diciembre - 2024