



Reanimación Neonatal

Odalis Poleth Moreno Guillen

Primer Parcial

Crecimiento y Desarrollo

Dr. Jorge López Cadenas

Licenciatura en medicina humana

Tercer semestre grupo "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de septiembre de 2024

REANIMACIÓN NEONATAL

Ventilación con presión positiva
 Frecuencia; 40-60 x
 Ritmo y tiempo inspiratorio;
 "ventila, dos, tres — ventila, dos, tres"
 Presión; 20-25 cm H₂O (tres dedos)
 Ciclo; 30 segundos

Pasos correctos
 Mascarilla; ajustada
 Reposicionar vía aérea
 Succión en boca y nariz
 O; boca abierta
 Presión; aumentar
 Alterne la vía aérea

Intubación orotraqueal
 Hoja recta de laringoscopio;
 N° 4; APT
 N° 0; ANPT
 N° 00; ANPT extremos

¿Cuándo introducir el tubo endotraqueal?
 Distancia del tabique nasal
 al trayo de la oreja + 10cm

Peso (kg)	D _i de tubo endotraqueal (mm)	SDG
<1.0	2.5	<28
1.0-2.0	3.0	28-34
>2.0	3.5	>34

Deturora recurrente Post-Intubación
 D; tubo endotraqueal desplazado
 O; tubo endotraqueal obstruido
 P; Neumotórax
 E; falla del equipo



