



**Mi Universidad**

## **Diagrama**

*Damaris Yamileth Espinosa Albores*

*Parcial I*

*Crecimiento y desarrollo*


*Dr. Jorge López Cadena.*

*Licenciatura en Medicina Humana*

*Tercer Semestre grupo "C"*

*Comitán de Domínguez, Chiapas a 14 de septiembre de 2024.*

# REANIMACIÓN NEONATAL



4 Preguntas previas al nacimiento.

- Edad gestacional exacta?
- Líquido amniótico claro?
- Factores de riesgo adversos
- Plan del cordón umbilical?

Ventilación con presión positiva.

Frecuencia: 40-60 x'.

Ritmo y tiempo inspiratorio

Ventila desfrenado des tres...

Presión 20-25 cm(H<sub>2</sub>O) 3 asdas

1 ciclo: 30 segundos

Pasos correctivos

Máscara: ajustarla

Reposicionar vía aérea

Succión en boca y nariz

O = boca abierta

Presión: aumentarla

Alternar la vía aérea.

Intubación orotraqueal

Hoja recta de laringoscopia

Nº1 = RNT

Nº0 = RNPT

Nº00 = RNPT extrínsecos

¿Cuánto introducir el tubo endotraqueal?

Distancia del tabique nasal al trago de la oreja + 1 cm

**Compresión torácicas**

Profundidad: 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax

Frecuencia: 90 x'.

Coordinación: 3 compresiones + 1 ventilación cada 2-3.

Ritmo: "uno y dos" 4 veces 4 ventilación 4..."

**Pasos correctivos**

Chest: Movimiento torax

Airway: vía aérea segura

Rate: ritmo adecuado

Depth: Profundidad adecuada

FiO<sub>2</sub>: al 10%.

**Adrenalina**

Concentración: 1:10,000 (0.1 mg/ml)

Vía y Dosis

IV o IO: 0.2 ml/kg (0.02 mg/kg)

ET: 1 ml/kg (0.1 mg/kg)

Se puede repetir la dosis cada 3-5 minutos