



# Esquema de vacunación

*Carlos Javier Velasco Sarquiz*

*Esquema de vacunación*

*Tercer Parcial*

*Crecimiento y desarrollo*

*DR. Jorge Cadenas López*

*Medicina Humana*

*Tercer semestre*

*Comitán de Domínguez Chiapas a 8 de diciembre del 2024*

Vacunas	Indicacion	Via de administracion	Grupo de Edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
BCG	Prevencion de Tuberculosis (formas graves)	Intracutanea • brazo derecho	Recien nacidos (< 1 año)	1 dosis al nacer	0.1 ml	Inmune de deficiencias fiebre aguda. Peso < 2 kg al nacer
Hepatitis B	Prevencion de hepatitis B	Intramuscular • musculo o deltoides	Recien nacidos y niños	3 dosis al nacer 2 y 6 meses	0.5 ml	Alergias Componentes de la vacuna fiebre aguda
Hexavalente Acetular	Protege contra la difteria, Tetanos, Tos ferrea, Hepatitis B, Poliomielitis	Intramuscular • musculo	5 años (lactantes)	5 dosis 2, 4 y 6 meses Refuerzo al año y medio	0.5 ml	Reaccion Severa Previo encefalopatia no explicado en los 7 dias Posterior a la vacunacion Previo
DPT	Refuerzo de difteria y Tos ferrea	Intramuscular • musculo	4-6 años	Cada dos años Cero 12 meses	0.5 ml	Reaccion alergica grave previo esteroides febriles agudas

Vacunas	Indicacion	Via de administracion	Grupo de Edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
Rotavirus	Prevencion de Gastroenteritis Por Rotavirus	Oral	< 8 meses	2-3 dosis 2, 4, 6 meses Segun la vacuna	1.5 - 2 ml	Inmune de def. Casos Severos anteriores de inmigracion Intestinal
Antineumococo	Prevencion Por Infecciones Por Streptococcus Pneumoniae	Intramuscular • musculo • Deltoides	< 5 años y mayores de 65 años	2 o 3 dosis en lactantes 2, 4 y 12 meses Adultos unico	0.5 ml	Fiebre aguda alergia o Componentes de Vacunas
Influenza	Prevencion de gripa estacional	Intramuscular • musculo • Deltoides	≥ 6 meses y en grupo de Riesgo	Anual	0.25 0.5 ml	Alergia al huevo enfermedad febril Aguda
Antipolio	Prevencion de la poliomielitis	Oral Intramuscular	< 5 años	3 dosis, 2, 4 y 6 meses + Refuerzos a los meses	0.1 0.5 ml o dos gotas Oral	Inmune de deficiencias Severas.

Vacunas	Indicaciones	Via de administracion	Edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
Vacuna Doble Viral	Para inmunización activa contra el Sarampio y la Rubéola	Subcutánea	A partir de los 10 años 1-4 años	Dosis 2 Con intervalo de un mes	0.5 mL	• No embarazada • Pese a los ciertos febriles 38.5 °C
Vacuna Antineumocócica 23	Inmunización Activa contra Infección de Streptococcus Pneumoniae	Intramuscular Region del deltoides brazo derecho	Adultos de 65 años y niños de 2 años	Dosis única	0.5 mL	• Fiebre de 38.5 °C • Pese a los antecedentes de reacción alérgica
Vacuna Anti-hepatitis A inactivada	Inmunización Activa contra el Virus de la hepatitis A	Intramuscular 48 meses de edad, tercio medio de la cara anterolateral	A partir de los 12 meses de edad	Dos dosis 1: día cero 2: 6-12 meses después de la primera	0.5 mL	• No niños < 1 año con fiebre • Durante el embarazo y la lactancia
Vacuna Tetra viral (S.R.P.V)	Prevención del Sarampio, Rubéola, Varicela y Parotiditis	Subcutánea cara Superior externa del tórax del brazo izquierdo	12 meses de edad y 12 años	1º: 12-15 meses de edad 2º: 4-6 meses	0.5 mL	• Antecedentes de reacción a antibióticos
Vacuna Sarampio	Inmunización Activa contra	Subcutánea cara Superior externa	A partir del año de	Dosis única	0.5 mL	Mujer embarazada Fiebre de 38.5

Vacunas	Indicaciones	Via de administracion	Edad	Esquema	Dosis	Contraindicaciones
Vacuna Contra Virus del Papiloma humano	Prevencion de infecciones Causadas Por el Virus del Papiloma humano	Intramuscular Preferentemente en la region del brazo derecho	9 años	Fecha de llegada 2º: al mes o dos meses de la inicial	0.5 mL	Mujer embarazada Hipersensibilidad Fiebre > 38.5°C No menores de 9 años
Vacuna Anticelular Inactiva oral	Para Inmunizar a quien Contra el Colera	oral	2 años	3: Niños de 2 años aplicar tres dosis en el intervalo	0.75 mL niños de 2 y 5 años	No menores de 2 años No pacientes con enfermedades
Vacuna Antimalarica	Prevencion de la malaria	oral	2 años	Depende del medicamento especifico utilizado	Segun medicamento especifico	Hipersensibilidad