



Mi Universidad

Cuadros Comparativos

Alexander Solórzano Monzón

Daniela Monserrat López Pérez

Concepción, Embarazo y Parto

Parcial II

Sexualidad Humana

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Medicina Humana

Semestre III

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre de 2024

DESARROLLO FETAL		
1er Trimestre (1-3 Mes) (1-12 Semana)	2do Trimestre (4-6 Mes) (13-26 Semana)	3er Trimestre (7-9 Mes) (27-38 Semana)
3 SDG. El embrión mide cerca de 0.2 cm.	14 SDG. A finales se observa el avivamiento	27 SDG. Al principio se forman depósitos de grasa por debajo de la piel
3-4 SDG. La cabeza se desarrolla de manera considerable/ Se comienza a formar el SNC/ Se observa los inicios de ojos y orejas.	18 SDG. La mujer ha sentido los movimientos durante dos o cuatro semanas/ Foco fetal	27-30 SDG. El feto rota dentro del útero, para tomar una posición de cabeza
4 SDG. A finales se construye la columna vertebral.	20 SDG. El feto abre los ojos por primera vez	31-34 SDG. Al final pesa en promedio 2 500 g
4-8 SDG. Se desarrollan las partes corporales externas (ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas y pies)	24 SDG. Es sensible a la luz/ Puede escuchar sonidos in útero/ Movimiento de brazos y piernas son vigoroso/ Alterna entre periodos de vigilia y sueño	37-38 SDG. Él bebe a término pesa 3 300 g/ Mide 50 cm
8 SDG. La “cola” ha desaparecido.	26 SDG. Al final del segundo trimestre la piel se encuentra arrugada y cubierta de vello sedoso	
7 SDG. A finales se ha formado el hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino y han comenzado a funcionar de manera limitada/ Se han formado las gónadas		
10 SDG. Al final el embrión tiene un conjunto de dedos y uñas.		
12 SDG. Ya se puede distinguir el género del feto/ Mide 10 cm/ Pesa 19 g		

CAMBIOS MATERNOS DEL EMBARAZO

1er Trimestre (1-3 Mes) (1-12 Semana)		2do Trimestre (4-6 Mes) (13-26 Semana)		3er Trimestre (7-9 Mes) (27-38 Semana)	
Físicos	Psicológicos	Físicos	Psicológicos	Físicos	Psicológicos
Aumento en los niveles hormonales (estrógeno y progesterona)	Cambios emocionales de estar muy feliz a la depresión, el llanto y de regreso.	Concientización del avivamiento	Calma.	Útero grande y duro	Sentimientos de bienestar con apoyo Social.
Mamas inflamadas y sensación de hormigueo	Es irracional.	Vientre en rápida expansión	Bienestar.	No se concilia el sueño (debido a la actividad del feto)	Inconformidad con sus maridos al ser primerizas.
Pezones y areolas pueden oscurecerse y ampliarse	Actitud: Desea (menos ansiosas), no deseado (más ansiosas).	Desaparecen la mayoría de síntomas del 1er trimestre	Menor temor al aborto gracias a los movimientos del feto.	Incomodidad (por la presión del útero sobre otros órganos)	Menores niveles de ansiedad e insomnio al intercambiar más afecto con sus esposos.
Micción frecuente	Clase social: baja (más depresión), alta (menos depresión).	Estreñimiento y sangrado	Disminución de la depresión con el apoyo social.	Disnea (presión del útero sobre los pulmones)	
Nauseas matutinas y tal vez hasta llegar al vomito	Apoyo social: Más apoyo (menos deprimidas).	Edema en (cara, manos, muñecas, tobillos y pies)	Mayor sentimiento por cuidados e interés por el bebé.	Indigestión (por la opresión al estómago)	
Repulsión hacia la comida o hacia el olor	Ansiedad por aborto espontaneo.	Las mamas han completado su desarrollo (prepara para el amamantamiento)		Obligo como si estuviera hacia delante	
Aumento de los exudados vaginales		Es posible la aparición del calostro		Corazón en tensión (por el aumento del volumen sanguíneos)	
Fatiga y sueño				Disminución de energía	
				Aumento de peso	
				Caminado de "pato"	
				Dolor de espalda	
				Contracciones de Braxton-Hicks	

SIGNOS DEL EMBARAZO		
Presuntivos	Probables	Confirmatorios
Amenorrea.	Detección de la presencia de HCG en orina.	Latido de corazón fetal 4to mes.
Sensibilidad en mamas.	Radioinmunoanálisis beta-HCG.	Movimiento fetal activo 4to mes.
Elevación de la temperatura.	Pruebas caseras de embarazo First Response, Fact Plus, Answer y Clear Blue.	Detección del esqueleto fetal (por ultrasonido y detectables en el 1er trimestre).
Nauseas/vómitos.		
Fatiga y necesidad de dormir más.		
Micciones más frecuentes.		

BIBLIOGRAFÍA

Janet Shibley Hyde, J. D. (2006). *Sexualidad Humana* (9 ed.). McGraw-Hill.