



**Mi Universidad**

**Cuadros comparativos**

*Manuel Alexis Albores López*

*Damaris Yamileth Espinosa Albores*

*Parcial II*



*Sexualidad humana*

*Dra. Mariana Catalina Sucedo Domínguez*

*Licenciatura en Medicina Humana*

*Tercer Semestre grupo "C"*

## "DESARROLLO FETAL"

	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre
 <p>Semana 3</p>	-El embrión mide cerca de 0.2cm		
 <p>Semana 3-4</p>	-La cabeza se desarrolla de manera considerable -Se forma el SNC -Inicios de ojos y orejas		
 <p>Semana 4</p>	-Se construye la columna vertebral		
 <p>Semana 4-8</p>	-Desarrollo de las partes corporales externas (ojos, orejas, brazos, manos, dedos, piernas, pies y dedos de los pies)		
 <p>Finales semana 7</p>	-Se forma hígado, pulmones, páncreas, riñones e intestino, funcionando de manera limitada -Se forma gonadas (sexo no distinguible)		
 <p>Finales de Semana 8</p>	-Desaparece la "cola"		
 <p>Finales Semana 10</p>	-Tiene un conjunto completo de dedos y de uñas		
 <p>Semana 12</p>	-Se distingue el sexo -Mide cerca de 10cm y pesa 19 gramos -Se distingue más como humano		
 <p>Semana 14</p>		-Movimiento del feto (avivamiento)	
 <p>Semana 18</p>		-La mujer siente los movimientos del feto de 2 a 4 semanas -Se detecta latido cardíaco	
 <p>Semana 20</p>		-Sensible a la luz -Escucha sonidos en útero -Movimientos de piernas y brazos fuerte -Periodos de vigilia y sueño	
 <p>Finales</p>		-Piel del feto arrugada y cubierta de un vello sedoso	
 <p>Principios</p>			-Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel -Se pierde vello sedoso
 <p>Mes 7</p>			-Rotación del feto dentro del útero
 <p>Mes 8</p>			-Peso promedio de 2500g
 <p>Mes 8-9</p>			-Crecimiento rápido

# Cambios físicos y psicológicos maternos

	Cambios físicos	Cambios psicológicos
 <p>Primer trimestre (primeras 12 semanas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aumenta el nivel de hormonas (estrogenos y progesterona) debido a la placenta</li> <li>-Las mamas se inflaman y hormiguean</li> <li>-El pezón y la areola pueden oscurecerse y ampliarse</li> <li>-Necesidad de orinar con mayor frecuencia</li> <li>-Nauseas matutinas y probabilidad de vómito</li> <li>-Expansion del útero</li> <li>-Aumenta exudado vaginal</li> <li>-Sentimientos de fatiga y sueño</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-La actitud: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Las mujeres que desean el embarazo se encuentran menos ansiosas que las mujeres que no lo desean</li> </ul> </li> <li>-Clase social: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Los bajos ingresos se asocian con la depresión durante el embarazo</li> </ul> </li> <li>-Disponibilidad de apoyo social: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mujeres apoyadas por su pareja menor probabilidad de estar deprimida</li> </ul> </li> <li>-Puede haber fatiga y falta de energía</li> <li>-Mayor probabilidad de depresión</li> <li>-Puede haber ansiedad por preocupaciones a un aborto espontaneo</li> </ul>
 <p>Segundo trimestre (semana 13-26)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Desaparece la mayoría de los síntomas del primer trimestre</li> <li>-Incomodidades se minimizan</li> <li>-Estreñimientos</li> <li>-Sangrados nasales</li> <li>-Probable edema en car, manos, muñecas, tobillos y pies</li> <li>-Mamas completamente desarrolladas para almacenamiento</li> <li>-Posible líquido amarillento o ambar que sale de los pezones (calostro) sin leche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Periodo de calma y bienestar relativos</li> <li>-Disminuye el temor a un aborto espontaneo debido a movimientos del feto</li> <li>-Menos probabilidad de depresión</li> <li>-Mayor probabilidad de angustia en mujeres que ya han tenido embarazos</li> </ul>
 <p>Tercer trimestre (semana 27-38)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Útero muy grande y duro</li> <li>-La mujer se percata del tamaño del feto</li> <li>-Posibilidad de no conciliar los sueños a causa de sus maromas y eructos</li> <li>-El útero ejerce presión sobre otros órganos</li> <li>-El estómago se comprime se vuelve común la indigestión</li> <li>-Ombligo empujado hacia afuera</li> <li>-El corazón se encuentra bajo tensión a causa del aumento del volumen sanguíneo</li> <li>-Probable disminución de la energía</li> <li>-Aumento de peso</li> <li>-Posible caminado de "pato"</li> <li>-Puede haber constricciones de Braxton-Hicks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mujeres con apoyo tienen mejor bienestar psicológico</li> <li>-Mujeres con menor apoyo hay mayor probabilidad que el bebé tenga bajo peso</li> </ul>

# los signos del embarazo

	Presuntivo	Probable	Certero
	<p>Náuseas</p> 	<p>Amenorrea</p> 	<p>latido del corazón fetal</p> 
	<p>Vómitos</p> 	<p>Test B-HCG positivo</p> 	<p>Movimientos fetales activo</p> 
	<p>Poliaquiuria</p> 	<p>Leucorrea blanquecina</p> 	<p>ultrasonido</p> 
	<p>Irritabilidad</p> 	<p>Signos genitales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>cervix blando</li> <li>cuerpo uterino blando</li> <li>Fácil flexión del cuerpo sobre el cérvix</li> </ul>	
	<p>Mastodinia</p> 		
	<p>Cloasma grávido</p> 		
	<p>Somnolencia</p> 		

# **Bibliografía**

Shibley Hyde J., DeLamater John D. (2006) novena edición. Sexualidad humana