



Mi Universidad

Cuadros Comparativos

Odalis Poleth Moreno Guillen

María Fernanda Pérez Guillen

II parcial

Sexualidad Humana

Dra. Mariana Catalina Saucedo Domínguez

Licenciatura en medicina humana

Tercer semestre grupo "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre de 2024

Desarrollo Fetal

Primer Trimestre 1-12 semanas

Más notable

La pequeña masa de células implantada en el útero se convierte en un feto

3ra SDG; Mide cerca de 0.2 centímetros

3ra-4ta semana

- La cabeza se desarrolla de manera considerable
- El SNC se empieza a desarrollar
- Se observan el inicio de los ojos

Final de la 4ta semana; La columna vertebral se construye

Desarrollo embrionario; se puede observar la "cola", y desaparece en la 8va semana

4ta-8va semana; las partes externas se empiezan a desarrollar

- Ojos
- Orejas
- Brazos
- Manos
- Piernas
- Pies
- Dedos

Finales de la 7ma semana; Algunos órganos, ya se han formado y empiezan a funcionar de manera limitada

- Hígado
- Pulmones
- Riñones
- Intestinos
- Formación de gónadas completada

Finales de la Décima semana; el embrión desarrolla las uñas

El género se distingue con claridad

El feto es indudablemente humano y se convierte en lactante

Finales de la Duodécima semana (final del primer trimestre)

- Mide cerca de 10 cm y pesa aproximadamente 19 gramos
- A partir de aquí, el desarrollo consiste en crecimiento y diferenciación de estructuras que ya se encuentran presentes

Segundo Trimestre 13-26 semanas

Final de la decimocuarta semana; Los movimientos del feto se pueden detectar

Avivamiento

Decimoctava semana

- La mujer ha podido sentir los movimientos durante 2 a 4 semanas
- Se detectan los latidos cardiacos
- En este punto, al médico le ayuda a determinar la longitud de la gestación

Vigésima semana; el feto abre por primera vez los ojos

Vigésima cuarta semana; es sensible a la luz y puede escuchar sonidos in útero

En este momento, los movimientos de brazos y piernas son vigorosos y el feto alterna entre periodos de vigilia y sueño

Al final del segundo trimestre, la piel del feto esta arrugada y cubierta de vello sedoso

Tercer Trimestre semana 27 al parto

Principios del tercer trimestre

- Se forman depósitos de grasa por debajo de la piel
- El vello sedoso se pierde
- Le dan al lactante características de la apariencia regordeta de los bebés

Séptimo mes

- El feto rota dentro del útero y asume una posición de cabeza
- Le dan al lactante características de la apariencia regordeta de los bebés

Final del octavo mes

- Pesa en promedio 2,500 gramos
- El bebé promedio a termino pesa 3,300 gramos y mide 50 cm

Características

Imágenes



Primer mes



Segundo Mes



Tercer mes



Cuarto mes



Quinto mes



Sexto mes



Séptimo mes



Octavo mes



Novena semana

CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS MATEERNOS

	Cambios Físicos	Cambios Psicológicos
Primer trimestre (1-12 semanas)	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento hormonal: Los niveles de hormonas como el estrógeno y la progesterona aumentan significativamente. - Cambios endocrinos. - Fatiga y sueño debido a los altos niveles de progesterona, que tiene un efecto sedante. - Náuseas y vómitos, conocidos como "náuseas matutinas", pero pueden ocurrir en cualquier momento del día, causados por el aumento hormonal. - Cambios en los senos: Hinchazón, sensibilidad, hormigueo y oscurecimiento de los pezones. - Aumento del volumen sanguíneo, lo que puede causar mareos. - Micción frecuente: El útero en crecimiento comienza a presionar la vejiga. - Exudados vaginales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ansiedad sobre el futuro, la salud del bebé y las responsabilidades de la maternidad - Cambios de humor frecuentes debido a las fluctuaciones hormonales. - Sentimientos de incertidumbre y miedo al aborto espontáneo, especialmente si es el primer embarazo. - Comienza un proceso de adaptación emocional hacia el embarazo y la idea de convertirse en madre. - Estrés por disponibilidad de apoyo social. - Depresión, por factores en clase social y economía.
Segundo trimestre (13 a 26 semanas)	<ul style="list-style-type: none"> - Disminución de las náuseas y fatiga en la mayoría de los casos, lo que mejora el bienestar físico. - Movimientos fetales que comienzan a sentirse - Crecimiento visible del abdomen, al expandirse el útero hacia afuera. - Presencia de estreñimiento y sangrados nasales. - Posibilidad de edema en cara, manos, muñecas, tobillos y pies. - Dolores de espalda y pelvis: A medida que el útero crece, se ejerce presión en la espalda baja y las caderas. - Aumento de peso y posibles estrías. - Líquido amarillo o ámbar llamado calostro (19 SDG). 	<ul style="list-style-type: none"> - Generalmente, hay una disminución en la ansiedad y un estado emocional más estable, ya que los malestares del primer trimestre han disminuido. - Mayor conexión emocional con el feto, especialmente cuando la madre comienza a sentir los movimientos. - Aumenta el sentimiento de cuidado o de interés materno. - Sentirse torpes y resentidas por su figura abultada. - Disminuye temor al aborto espontáneo. - Menos probabilidades de depresión.
Tercer trimestre (semana 27 a parto)	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor ganancia de peso: El bebé crece rápidamente en este trimestre, lo que contribuye a un aumento notable en el peso de la madre entre 25 y 35 libras - Disminución de energía. - Corazón bajo tensión a causa del aumento en volumen sanguíneo. - Útero muy grande y duro. - El ombligo se ve empujado hacia afuera. - Falta de respiración. - El estomago se oprime y la indigestión se vuelve común. - Aumento en la micción: El útero en crecimiento presiona la vejiga con más fuerza. - Contracciones de Braxton Hicks: Contracciones irregulares e indoloras que preparan el cuerpo para el parto. - El bebé rota y la cabeza desciende a la pelvis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ansiedad por el parto, con preocupaciones sobre el dolor, las complicaciones, y la salud del bebé. - Los patrones señalados con anterioridad continúan durante este trimestre. - Fatiga emocional y física, debido al aumento del peso y la incomodidad física. - Bienestar psicológico mayor entre mujeres que cuentan con un apoyo social. - Menores niveles de ansiedad e insomnio. - Mayor enfoque en el vínculo emocional con el bebé, con momentos de reflexión sobre cómo será la vida tras el parto.

Signos presuntivos, probables y confirmatorios del embarazo

	Signos	Pruebas de detección	Momento de realizarlas
<p>Presuntivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Amenorrea Sensibilidad de las mamas Nauseas y vómitos La temperatura se eleva Micción frecuente Sensación de fatiga 	<p>Pruebas de laboratorio</p> <ul style="list-style-type: none"> Prueba inmunológica basada en la detección de la presencia de hCG en la orina de la mujer Radioinmunoanálisis beta-HcG <p>Hormona Gonadotropina coriónica humana</p> 	<p>Deberían realizarse 7 días después de la fertilización</p>
<p>Probables</p>	<p>Pruebas de embarazo</p> 	<p>Pruebas caseras</p> <ul style="list-style-type: none"> First response Fact plus Answer Clear Blue <p>25-38% falsos negativos y 16% falsos positivos</p> 	<p>Para prevenirse en contra de falsos negativos, los fabricantes recomiendan que se repita la prueba una semana después en caso de que haya resultado negativo la primera vez</p>
<p>Confirmatorios</p>	<ul style="list-style-type: none"> Latido del corazón fetal Movimiento fetal activo Detección del esqueleto fetal por medio del ultrasonido 		

Referencias;

- (S/f-c). Edu.mx. Recuperado el 12 de octubre de 2024, de <https://biblioteca.unipac.edu.mx/wp-content/uploads/2017/06/Sexualidad-Humana-9na-ed.pdf>