



Esquema

Briseida Guadalupe Torres Zamorano.

Parcial I

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico


Dr. Jesús Eduardo Cruz Domínguez

Medicina Humana

4° "A"

Comitán de Domínguez, chis; A 13 de septiembre de 2024.

Exploración Pupilar...



ISOCORIA
-Pupilas de igual tamaño



Normales de 2 mm de diametro

MIOSIS
-Contracción excesiva de las pupilas



- Pilocarpina
- Iridociclitis
- Intoxicación por insecticida y drogas (Nicotina, antihistamínicos y opiáceos)

Midriasis
-Dilatación excesiva de las pupilas



- Atropina
- Glucosa aguda
- Alteración del III par craneal
- Falta de oxigenación
- Psicótropas (cocaína, Anfetamina)

ANISOCORIA
-Pupila de tamaño desigual.



- Tumores
- TCE o ACV
- Aneurisma cerebral
- Meningitis y Encefalitis.

Según el tamaño

- Miosis - Diámetro < 2 mm
- Medias - Diámetro 2-5 mm
- Midriasis - Diámetro > 5

Según relación entre ellas

- Isocóricas - Iguales
- Anisocóricas - Desiguales
- Discóricas - Forma irregular

Según Respuesta a la luz

- Reactivas - contracción al foco luminoso
- Areactivas - Inmóviles al foco luminoso

Bibliografía

Serrano M. A. EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA

VALORACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA Y PUPILAS. ¿CÓMO DETECTAR EL DETERIORO NEUROLÓGICO EN UN PACIENTE CON TCE LEVE? [citado 27 septiembre 2021];