



**Citlali Monserrath Campos Aguilar**

**Investigacion Epidemiologica Avanzada**

**Dra. Arely Alejandra Aguilar Velasco**

**4“A”**

## INTRODUCCION

**Ascaris:** *Ascaris lumbricoides* es un parásito intestinal que causa la ascariasis, una infección común en muchas partes del mundo, especialmente en áreas con condiciones sanitarias deficientes. Los gusanos pueden llegar a medir hasta 30 cm de largo y vivir en el intestino delgado. La infección ocurre cuando una persona ingiere huevos del parásito, presentes en alimentos o agua contaminados. Los síntomas pueden variar desde dolor abdominal hasta complicaciones más graves si los gusanos migran hacia otros órganos. La ascariasis es tratada generalmente con medicamentos antiparasitarios como el albendazol o mebendazol.

**Otitis media aguda:** Es una infección del oído medio, común en niños, que se caracteriza por dolor, fiebre y a veces secreción en el oído. Generalmente, es causada por una infección viral o bacteriana, a menudo secundaria a resfriados o infecciones respiratorias. La inflamación en el oído medio puede causar la acumulación de líquido y presión, lo que provoca dolor. En algunos casos, la infección puede resolverse por sí sola, pero en otros, puede requerir antibióticos o tratamientos para aliviar los síntomas. La otitis media aguda es una de las infecciones más frecuentes en la infancia.


## CONCLUSION

Tanto la ascariasis como la otitis media aguda son enfermedades infecciosas comunes, pero tienen orígenes y mecanismos muy diferentes. La **ascariasis**, causada por el parásito *Ascaris lumbricoides*, destaca principalmente por su transmisión a través de la ingestión de huevos contaminados en ambientes con deficientes condiciones de higiene. A pesar de que en muchos casos la infección puede ser asintomática, cuando se presentan síntomas, estos pueden ir desde molestias gastrointestinales hasta complicaciones graves que afectan órganos vitales. Su tratamiento con antiparasitarios suele ser efectivo si se detecta a tiempo.

Por otro lado, la **otitis media aguda** es una infección del oído medio común, especialmente en niños, que puede ser causada por virus o bacterias, a menudo asociada a infecciones respiratorias. Aunque generalmente es autolimitada, en ocasiones puede generar complicaciones si no se trata adecuadamente. Los síntomas incluyen dolor, fiebre y, en algunos casos, secreción

---

# ASCARIS



# OTITIS MEDIA AGUDA

