



TRIPTICOS

Citlali Monserrath Campos Aguilar

INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA AVANZADA

Dra Arely Alejandra Aguilar Velazco

4“A”

CHAGAS



VECTOR

insecto triatomino también conocido como chinche besucona

AMBIENTE

El riesgo de transmisión de la enfermedad está estrechamente relacionado con la biodiversidad de las áreas silvestres.



HISTORIA

fue descrita hacia el año 1909 por el médico brasileño Carlos Chagas mientras completaba sus estudios en medicina durante un brote de fiebre amarilla en su país natal,

HISTORIA

Historia relacionada con la descripción de los transmisores de la enfermedad y el descubrimiento de la misma por el médico brasileño Carlos Chagas

EPIDEMIOLOGIA

La enfermedad de Chagas es endémica en 21 países de las Américas y afecta a un estimado de 6 millones de personas. En las Américas, se registran 30.000 nuevos casos cada año, 12.000 muertes en promedio y aproximadamente 9.000 recién nacidos se infectan durante la gestación.



CICLO

La enfermedad de Chagas pasa por 2 estadios sucesivos: una fase aguda y otra crónica¹⁷. La fase inicial de la infección dura entre 4-8 semanas y la fase crónica persiste durante toda la vida

Ciclo de transmisión vectorial del Chagas



CUADRO CLINICO

- Fiebre
- Malestar general
- Chagoma
- Hepatomegalia o Esplenomegalia
- Linfadenopatía



MANEJO

- Fase aguda:
Antiparacitarios



- Fase crónica:
Quirúrgico



TRATAMIENTO

- Niños:
Benznidazol
5-10 mg/kg/día
después de los
alimentos

NIFORTIMOX

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASA EN CONTRA DE LA CHINCHESUCONA



Limpia y esbomba
constantemente tu hogar.

Evitar acumular basura
o escombros en el jardín.

Mantener limpias a las
mascotas y sus lugares
para dormir.

Revisa camas, roperos,
muebles o paredes donde
pueda ocultarse.

Cocer perfectamente los
alimentos cárnicos
de animales del
campo.

CHINKUNGUÑA



El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados

- Su nombre proviene de la lengua makonde y significa "doblarse por el dolor" o "caminar encorvado".



MANEJO DOMICILIARIO



MANEJO CLINICO

- Acetaminofen
- Ibuprofeno
- Naproxeno



ASPIRINA NO

LABORATORIOS

- Defectos del embarazo
- Síndrome de Guillain Barre
- Dolor Articular

LABORATORIOS

- Reacción de cadena de la polimerasa PCR


Prueba rápida: IgG-IgM



El virus del chikungunya se transmite a través de la picadura de mosquitos de las especies *Aedes aegypti* o *Aedes albopictus*, también conocido como el mosquito tigre.



El virus del chikungunya se encuentra en regiones tropicales y subtropicales



Los síntomas más comunes del chikunguña son

- Fiebre mayor a 38° C
- Artralgia
- cefalea
- Dolor en la espalda
- Mialgia
- Náuseas
- Manchas rojas en la piel (erupciones)
- Conjuntivitis (enrojecimiento de los ojos)

FASES

FASE
VIREMICA
TARDA 5 DIAS

FASE AGUDA
3-10 DIAS

SUBAGUDA 2-
3 MESES

CRONICA
DESPUES DE 3
MESES



BIBLIOGRAFIA

OPS, Organización mundial de la salud