

CUADRO COMPARATIVO

Citlali Monserrath Campos Aguilar

Investigacion Epidemiologica Avanzada

Dra. Arely Alejandra Aguilar Velasco

4 "A"

DENGUE

Fiebre Moderada muy frecuente de 5 a 7 días

Cefalea intensa, frecuente, dolor detrás de los ojos.

Náusea, vómitos*, diarreas, dolor abdominal**.

Prurito leve a intenso

Dolores musculares, articulares o solamente dolor muscular intenso

Leucopenia moderada-intensa, hematócrito elevado, recuento plaquetario normal o muy bajo

Sangrados en piel y mucosas

Petequias o prueba del torniquete positiva

ZIKA

Fiebre leve o ausente, poco frecuente, de 1 a 3 días.

Cefalea leve o moderada

Dolores articulares, menos frecuente los musculares

Erupciones en la piel, prurito moderado o intenso.
(Exantema maculopapular céfalo-caudal típicamente desde el primer día)

Ojos rojos o conjuntivitis no purulenta, muy frecuente

Leucopenia leve a moderada, proteína C reactiva positiva

Síndrome de Guillain-Barre en fase post infecciosa

Edema en las extremidades inferiores y dorso de las manos

CHIKUNGUNYA

Fiebre intensa de inicio súbito mayor de 38,5 °C, muy frecuente, de 3 a 5 días.

Cefalea leve o moderada.

Dolores de espalda, musculares, articulares o solamente dolor articular intenso simétrico y distal

Exantema del día 2 al 3.
Prurito leve - moderado

Ampollas y úlceras en la piel

Conjuntivitis ocasional.

Leucopenia leve a moderada, proteína C reactiva positiva

Edemas de manos y pies.

Bibliografia

de Araújo TVB, Ximenes RA de A, Miranda-Filho D de B, et al.
Association between microcephaly, Zika virus infection, and other risk factors in Brazil: Final report of a case-control study. *Lancet Infect Dis.* 3099(17)30727-2