



**Liliana Pérez López**

**Dra. Lucia Diaz**

**Cuadro comparativo**

**Psiquiatría**

**Quinto semestre**

**Grupo "A"**

Comitán de Domínguez Chiapas, a 06 de diciembre de 2024.

# Sx. ANTICOLINÉRGICO → Px "Seco"

Resultado del bloqueo competitivo de acetilcolina → Impide función de los "NT"

Causa → Atropina

Antihistamínicos

Neuropilépticos

Antipsicóticos

Antidepresivo tricíclico

Cuadro clínico → Taquicardia

Miiasis

Hipertermia

Piel seca

Tx → Base → Monitorización electrocardiográfica  
Bicarbonato

Específico → Fisostigmina

Mecanismo:

Px "Seco" puede causar muerte por hipertermia y disritmia.

# Sx. COLINÉRGICO → Px "Mojado"

Resultado de hiperestimulación de receptores muscarínicos de la acetilcolina en sinapsis parasimpáticas postganglionar.

Causas → Organofosforados

Polícarpina

Neostigmina

Piridostigmina

Fisostigmina

Cuadro clínico → Muscarínico:

Nicotínico: Bradicardia

Taquicardia Miosis

Miosis Sialorrea

Temblores Lagrimación

Insu. Respiratoria

Dx → Estimación de la Colinesterasa  
Eritrocitaria.

Tx → Base → Monitorización Específica: Electrocardiográfica. → Atropina  
Control de vía aérea + Hidratación

# Sx. SEROTONINÉRGICO

Produce una actividad aumentada del sistema nervioso central  
↳ Aumenta la actividad de serotonina.

Causas → Fluoxetina

Citalopram

Valproato

Ondasetrón

Metoclopramida

Dextrometorfano

Cuadro clínico → Fiebre

Taquicardia

Hipertensión

Diaforesis

Mioclónica/rigidez

Miiasis

Diarrea

Tx → Soluciones IV

Sintomático → Benzodiazepinas

# INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL

Ingesta rápida supra-terapéutica, daño por metabolito reactivo  
"N-acetil-Para-Benzoquinonimina" → Causa Insuficiencia hepática

Dosis para Intoxicación → Adultos → 7.5g - 10g

Niños → > 200 mg/kg

+6 años → > 10g - 200 mg/kg

Fases: 1 → 30-1 día

Náusea, vómito y anorexia.

Dx → Nomograma de Rumack-Matthew

INR + 6.5 → Falla hepática fulminante

4 → 5 días - 2 sem

Resolución de

Tx → Inicial → Lavado gástrico

Carbon activado

Específico → N-acetilcisteína IV/oral

2 → 1-3 días

Dolor en CSD, náusea vómito y ↑ de PFH.

3 → 2-4 días

Falla hepática, ↓ neurológica, falla renal/orgánica.