



Carolina Hernández Hernández

**Doctor Aguilar Ocampo Cristian
Jonathan
Infografía**

PASIÓN POR EDUCAR

Psiquiatría

5 “A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 5 de noviembre del 2024.

TRASTORNO DE ESTADO DE PANICO

PANIC ATTACK

- Se caracteriza por crisis de pánico espontáneos
- Estos ataques se asocian con agorafobia
- (Miedo intenso a los espacios abiertos, a salir solo de casa o estar entre una multitud)



ETAPAS

- Ataques subclínicos
 - Crisis de angustia completos
 - Ansiedad anticipatoria
 - Evitación fóbica de situaciones específicas agorafobia
- Se asocia mayor riesgo a las mujeres



CONDUCE


- Abuso de alcohol
- Abuso de drogas
- Depresión
- Restricciones ocupacionales y sociales

La agorafobia puede presentarse sola aun que algunos px sufren crisis de pánico asociadas



SINTOMAS ATAQUE DE PANICO

- Diaforesis
- Palpitaciones y taquicardia
- Inquietud
- Sensacion de falta de aliento o asfixia
- Sensacion de sofocacion




SINTOMAS FOBICA

- Ansiedad
- Fatiga
- Palpitaciones
- Nauseas
- Temblor
- Sudoración



DIAGNOSTICO

- Aspecto psicoanalítico
- Estudios genéticos
- Tomografía
- Resonancia magnética



TRATAMIENTO

- Benzodiazepinas
- Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
- Inhibidores de la mono aminoácidos



“Manual de Psiquiatría Clínica” de Kaplan y Sadock, 6ª edición:
Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2017). Manual de Psiquiatría Clínica (6ª ed.).
Editorial Médica Panamericana.