



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA
CAMPUS COMITÁN

“TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO”

ALUMNO: LEONARDO DOMÍNGUEZ TURRÉN

DOCENTE: DR. CRISTIAN AGUILAR OCAMPO

MATERIA: PSIQUIATRÍA CLÍNICA

COMITÁN de DOMÍNGUEZ, CHIAPAS a 12 de SEPTIEMBRE de 2024.

Trastornos del

NEURODESARROLLO

Estos trastornos suelen ser diagnosticados por primera vez en la lactancia, niñez o adolescencia.

1

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

-promedio de inteligencia significativamente bajo.

-deficiencia en el funcionamiento adaptativo.

puede ser:

- a) leve (IQ 50-55 a 70), b) moderada (35-40 a 50-55), c) grave (20-25 a 35-40), d) profunda (inferior a 20-25)

2

TRASTORNO DE LA COMUNICACION

Hay 4 tipos:

- a) **trastorno del lenguaje:** déficits en el desarrollo del vocabulario, dificultada para formar frases adecuadas a la edad.
- b) **trastorno fonológico:** dificultades en la articulación de palabras.
- c) **tartamudeo:** dificultad en la fluidez, velocidad y ritmo al hablar.
- d) **trastorno pragmático:** dificultad profunda en la interacción social.

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

comprende un conjunto de comportamientos que se caracterizan por dificultades graves en numerosas áreas del desarrollo, como reciprocidad social, comunicación y patrones de comportamiento o actividades de tipo restrictivo o repetitivo, incluyendo el habla. Hay 3 tipos:

- 1) Asperger 2) trastorno de Rett 3) ausencia total del lenguaje e interacción social.

3

4

TDAAH

es la falta de atención persistente, junto con hiperactividad, impulsividad o ambas, que ocasionan un deterioro del funcionamiento clínicamente significativo. Se observa tanto en niños como en adultos.

TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL APRENDIZAJE

déficits en la maduración del desarrollo que se asocian con dificultades para adquirir las habilidades específicas de la lectura (**dislexia**), expresión escrita o matemáticas (**discalculia**).

5

6

TRASTORNOS MOTORES

son: (1) trastorno del desarrollo de la coordinación: un deterioro en el desarrollo de la coordinación motriz. (2) trastorno de movimientos estereotipados: que consiste en una actividad motriz repetitiva. (3) trastornos de tics: caracterizados por la ejecución involuntaria, recurrente y estereotipada de movimientos o sonidos vocales. Existen dos tipos de trastornos de tics: el trastorno de Gilles de la Tourette, y el trastorno de tics motores o vocales persistente (crónico).

BIBLIOGRAFIA

Sadock, Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2019). Manual de Bolsillo de Psiquiatría Clínica (6a ed.). Wolters Kluwer.