



Mario Morales Argueta

Patologías quirúrgicas.

Clínicas quirúrgicas.

5.-A

Pancreatitis aguda.

Se caracteriza por la inflamación aguda del páncreas y del tejido alrededor de éste.

La pancreatitis puede ser:

- Moderada: que se manifiesta por el aumento de volumen del páncreas y suele responder al tratamiento médico de apoyo
- Severa: la inflamación es acompañada por complicaciones debido a la liberación de enzimas pancreáticas, lo que provoca digestión del tejido y afectan la circulación sanguínea, generando colecciones líquidas alrededor del páncreas, que al infectarse crean pseudoquistes o abscesos que pueden llegar hasta la necrosis alrededor de la glándula y requieren cirugía para eliminarlas, así como tratamiento médico de apoyo en las unidades de terapia intensiva.

Causas

El páncreas es un órgano localizado detrás del estómago. Produce las hormonas insulina y glucagón. También produce químicos, llamados enzimas, necesarios para digerir el alimento.

La mayoría de las veces, las enzimas están activas únicamente después de que llegan al intestino delgado.

- Si estas enzimas se vuelven activas dentro del páncreas, pueden digerir el tejido pancreático. Esto causa hinchazón, sangrado y daño al órgano y sus vasos sanguíneos.
- El problema se denomina pancreatitis aguda.

La pancreatitis aguda afecta más frecuentemente a hombres que a mujeres. Ciertas enfermedades, cirugías y hábitos hacen que usted tenga mayor probabilidad de desarrollar esta afección.

- El consumo de alcohol es responsable de hasta el 70% de los casos en los Estados Unidos. Cerca de 5 a 8 bebidas por día durante 5 años o más pueden dañar al páncreas.

- Los cálculos biliares son la siguiente causa más común. Cuando los cálculos biliares viajan fuera de la vesícula biliar hasta las vías biliares, pueden bloquear la abertura que drena la bilis y las enzimas. La bilis y las enzimas se "acumulan" en el páncreas y causan hinchazón.
- La genética puede ser un factor en algunos casos. A veces, la causa se desconoce.

Síntomas

El síntoma principal de la pancreatitis es un dolor que se siente en el cuadrante superior izquierdo o medio del abdomen.

El dolor:

- Puede empeorar en cuestión de minutos después de comer o beber al principio, principalmente si los alimentos tienen un alto contenido de grasa
- Se vuelve constante o más intenso y dura varios días
- Puede empeorar al acostarse boca arriba
- Puede propagarse (irradiarse) a la espalda o por debajo del omóplato izquierdo

Diagnostico:

Se pueden hacer los siguientes exámenes imagenológicos que pueden mostrar hinchazón del páncreas, pero no siempre son necesarios para el diagnóstico de la pancreatitis aguda:

- Tomografía computarizada del abdomen
- Resonancia magnética del abdomen
- Ultrasonido del abdomen

Tratamiento

El tratamiento a menudo requiere hospitalización y puede incluir:

- Analgésicos
- Líquidos administrados por vía intravenosa (IV)
- Suspender el consumo alimentos o líquidos por vía oral para limitar la actividad del páncreas. En el pasado, los pacientes no recibían alimentos durante varios días.

REFERENCIA:

<http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-SS-011-22/ER.pdf>