



Erivan Robely Ruiz Sánchez.

Dr. Alejandro Alberto Torres Guillen.

Resumen EHGA.

Medicina Interna

Quinto "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 4/12/2024.

Hepatopatía alcohólica

- Principal causa de enfermedad hepática en el mundo
- Se desarrolla en personas que consumen alcohol en exceso durante un periodo prolongado.

Esta consiste en tres lesiones principales.

Hígado graso

- forma común y temprana de patología
- Caracterizada por acumulación de grasa en el hígado.
- Asintomática y posiblemente reversible con abstinencia

Hepatitis alcohólica

- forma más grave que implica inflamación del hígado.
- Puede ir desde leve a grave e incluso muerte.
- Síntomas comunes: ictericia, fatiga, fiebre, dolor.

Cirrosis hepática alcohólica

- Etapa final
- Se caracteriza x formación de tejido cicatricial lo que lleva a pérdida de función
- Puede causar complicaciones como ascitis, encefalopatía hepática y sangrado variceal.

Patología

Estímulo hepatotóxico

↳ Respuesta histológica inicial: hígado graso

↳ Hepatitis alcohólica: lesión del hepatocito

↳ Degeneración globosa, necrosis irregular infiltrada, PMN, fibrosis peri-venular y perisinusoidal de Disse.

Clinica

• hepatomegalia insospechosa

• Incomodidad en cuadrante superior derecho

• Náuseas, fiebre, ictericia, hipertensión portal, ascitis, hemorragia por varices.

Diagnóstico

Hipoalbuminemia y coagulopatias con frecuencia en enf. avanzada

As.T. - ↑
ALT - ↑

* Ecografía para detectar infiltración grasa

↳ inervación de flujo vena porta, ascitis y colaterales intraabdominales

Alta mortalidad

lesión hepática grave

Hepatitis alcohólica

Coagulopatía

Anemia

Albumina sérica < 28 g/L

Bilirrubina sérica > 1.37 mmol/L

IR

Ascitis

Mortalidad: Meld — Child-pugh

Tratamiento

Abstinencia → Piedra angular

pentoxifilina — Prednisona

Transplante