



Emmanuel Hernández Domínguez

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Infografía

Psiquiatría

5-B

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de Octubre del 2024

TRANSTORNO ESQUIZOFREMIFORME



DEFINICIÓN

Conjunto de síntomas similares a los de la esquizofrenia, duran por lo menos 1 mes, se resuelven en alrededor de 6 meses y luego regresan al nivel inicial de funcionamiento

EPIDEMIOLOGÍA

- Frecuente en adolescentes, hombres y adultos jóvenes
- Proporción menor a la mitad de la esquizofrenia.
- Prevalencia de por vida del 0.2% y prevalencia a 1 año del 0.1%.



CLÍNICA

- Alucinaciones, delirios o ambos
- Deterioro funcional durante el episodio

ETIOLOGÍA

Las causas siguen siendo **DESCONOCIDAS**.



PRONÓSTICO

- Pronosticos favorables
- Progresión a esquizofrenia del 60 al 80%
- Otros remiten y presentan recurrencias periodicas

DIAGNÓSTICO

- Clínico

TRATAMIENTO

- Hospitalización
- Fármacos antipsicóticos
- Tx con litio, carbamazepina o valproato con fines terapéuticos o profilácticos



Sadock, B., Ahmad, S., & Sadock, V. (2019).
Manual de bolsillo de psiquiatría clínica.
Barcelona (España): Wolters Kluwer