



Javier Adonay Cabrera Bonilla

Cristian Jonathan Aguilar Ocampo


Psiquiatría

Clasificación del DSM-5

5°

“B”

Comitán de Domínguez, Chiapas a 12 de septiembre del 2024.



Trastornos del estado de ánimo



Trastorno depresivo mayor

La característica obligada del trastorno de depresión mayor es un estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer por las actividades habituales

Trastornos depresivos

se caracterizan por depresión, tristeza, irritabilidad, retraso psicomotor y, en los casos graves, ideación suicida. Incluyen diversas

trastorno depresivo especificado

incluye dos subtipos: (1) episodio depresivo recurrente, que supone un estado depresivo de al menos 2-13 días y que aparece por lo menos una vez al mes

(2) episodio depresivo de corta duración, en el que el estado de ánimo deprimido se prolonga entre 4 y 14 días, pero no se observan recurrencias

Distimia

es una forma de depresión leve y crónica que se prolonga por lo menos durante 2 años



Trastorno depresivo no especificado

-Melancolía: una forma grave de depresión mayor que se caracteriza por desesperanza, anhedonia y retraso psicomotor, alto riesgo de suicidio

-depresión atípica: marcada por un trastorno de ánimo deprimido asociado con ganancia de peso en lugar de pérdida, y con hipersomnia en lugar de insomnio

- Depresión posparto

-con patrón estacional: en el que el estado de ánimo deprimido aparece en un período determinado del año, por lo general en el invierno (trastorno afectivo estacional)

Trastorno disfórico premenstrual

Aparece aproximadamente 1 semana antes de la menstruación y se caracteriza por irritabilidad, labilidad emocional, cefalea y ansiedad o depresión, que remiten cuando acaba el ciclo menstrual



Trastorno depresivo inducido por sustancias/medicamentos

Se caracteriza por un estado de ánimo deprimido debido al consumo de alguna sustancia



Trastorno depresivo debido a otra afección médica

Es un estado secundario a una enfermedad
hipotiroidismo o síndrome de Cushing

Desregulación destructiva del estado de ánimo

nuevo diagnóstico entre los trastornos depresivos que se presenta en niños mayores de 6 años de edad y menores de 18 años, y se caracteriza por accesos de cólera intensos, irritabilidad crónica y estado de ánimo irascible.

Referencia bibliográfica:

Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2015). Kaplan & Sadock. Sinopsis de psiquiatría (11a ed.). Lippincott Williams & Wilkins.