



Axel Adnert Leon Lopez

Dr.cristian jonathan aguilar ocampo

trastorno de ansiedad generalizada

psiquiatria

5°

"B"

Comitán de Domínguez Chiapas 07/11/ 2024

TRASTORNOS DE ANSIEDAD

GENERALIZADA



ESTE SERA EL TRASTORNO CARACTERIZADO POR PREOCUPACION EXCESIVA



EPIDEMIOLOGIA

AFFECTARA DEL 2-5% DE LA POBLACION MUNDIAL E INCLUSO MAS
SE DARA COMUNMENTE EN MUJERES, POR LO QUE EL INDICE DE MUJERES AFECTADAS SERA MAYOR AL DE HOMBRES AFECTADOS
ESTA SERA PRESENTADA PRINCIPALMENTE EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, TENIENDO UN PICO DE LOS 30-40 AÑOS



CUADRO CLINICO

SINTOMAS FISICOS:
INQUIETUD E IMPACIENCIA
FACTIGA

DISNEA
HEPIGASTRALGIA
POLAQUIRIA
HIPERHIDROSIS

TENSION MUSCULAR
ALTERACIONES DEL SUEÑO, YA SE DIFICULTAD PARA DORMIR O SUEÑO NO REPARADOS

etiologia

NEUROTRASMISORES:
SEROTONINA,
NORADRENALINA Y
GABA.
FACTORES
PSICOLOGICOS

DIAGNOSTICO

DURACION:
ANSIEDAD,
PREOCUPACION, Y
EXCESIVA DURANTE 6
MESES.

TEST DE BENDER
SINTOMAS ASOCIADOS:
DEBE PRESENTARSE AL
MENOS 3 SINTOMAS



TRATAMIENTO

- 1.- PAROXETINE 20-50MG POR DIA
- 2.- ESCITALOPRAM: 10-20MG POR DIA
- 3.- DUOLOXETINE: 30-120MG POR DIA



BIBLIOGRAFIA:

ASSOCIATION, A. P. (s.f.). TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME. En A. P. ASSOCIATION, MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES (págs. 96-99). 5ta. EDICIÓN. DSM-5