



**Nombre del alumno: Leslie Dennis
Cabrera Sanchez**

**Nombre del profesor: Cristian
Jonathan Aguilar Ocampo**

Actividad: Infografía

Materia: Psiquiatría

Grado: 5

Grupo: B



TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME



Leslie Dennis Cabrera Sanchez

5.B

Psiquiatria

¿QUÉ ES ?

Conjunto de síntomas similares a los de la esquizofrenia, salvo que duran por lo menos 1 mes, se resuelven en alrededor de 6 meses y luego regresan al nivel inicial de funcionamiento.

EPIDEMIOLOGIA

SE SABE POCO SOBRE LA INCIDENCIA

MÁS FRECUENTE EN ADOLESCENTES, HOMBRES Y ADULTOS JÓVENES



ETIOLOGÍA

Los pacientes esquizofreniformes presentan más síntomas del estado de ánimo y un mejor pronóstico que los esquizofrénicos.



SIGNOS Y SÍNTOMAS

Es un trastorno psicótico de inicio rápido.

- Alucinaciones
- Delirios
- Deterioro funcional durante el episodio
- Síntomas psicóticos que aparecen al inicio del episodio
- Agitación emocional y confusión



EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

Los factores pronósticos favorables incluyen la ausencia de un afecto embotado o aplanado.

funcionamiento premórbido adecuado, confusión y desorientación durante el clímax del episodio psicótico.

Inicio de los síntomas psicóticos principales dentro de las 4 semanas de cualquier cambio apreciable en la conducta.

Algunos tienen un segundo o tercer episodio el cual muestran un deterioro hacia un estado más crónico de esquizofrenia.

TRATAMIENTO

Hospitalización

Fármacos antipsicóticos

Se puede considerar retirar o cambiar el medicamento si la psicosis remite por completo durante 6 meses.

Se puede intentar un tratamiento con litio, carbamazepina o valproato con fines terapéuticos.

LA PSICOTERAPIA



SE PUEDE INDICAR TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN ALGUNOS CASOS

Individuos con rasgos catatónicos o depresivos marcados.



BIBLIOGRAFÍA BENJAMIN J, S. S. (2019). KAPLAN Y SADOCK MANUAL DE BOLSILLO DE PSIQUIATRIA CLINICA. 6 EDICIÓN.