



**Adriana Itzel Gallegos Gómez.**

**Cristian Jonathan Aguilar Ocampo.**

**Infografía de trastorno psiquiátrico**

**Psiquiatría.**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**5to semestre.**

**“B”.**

# TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME



## DEFINICIÓN

Conjunto de síntomas similares a esquizofrenia, duran por lo menos 1 mes, se resuelven en 6 meses y luego regresan al nivel inicial de funcionamiento



## EPIDEMIOLOGÍA

Frecuente en adolescentes, hombres y adultos jóvenes. Su prevalencia de por vida del 0.2% y al año del 0.1%



## ETIOLOGÍA

Mayor frecuencia en familias de px con trastornos del estado de ánimo.



- LAS CAUSAS SIGEN SIENDO DESCONOCIDAS

## DX

Inicio rápido con alucinaciones, delirios. Es poco probable que se informe un deterioro progresivo en su funcionamiento social y ocupacional.

## DX DIFERENCIAL

- Esquizofrenia: si la duración es de más de 6 meses.
- Trastorno psicótico breve: síntomas durante menos de 1 mes.
- Trastorno del estado de ánimo y ansiedad: realizar anamnesis, debido a presencia de síntomas psicóticos.
- Trastorno psicótico inducido por sustancias: uso de medicamentos y pruebas toxicológicas
- Trastorno psicótico debido a una afección médica: anamnesis y exploración física, pruebas analíticas o estudios por imagen.



## TX

- A menudo se requiere hospitalización



- Fármacos antipsicóticos para tratar síntomas psicóticos.
- Se puede considerar retirar o cambiar el medicamento si la psicosis remite por completo durante 6 meses

## SE PUEDE INTENTAR...

Un tratamiento con:

- Litio
- Carbamazepina
- Valproato



Terapia electroconvulsiva en algunos casos, **SOBRE TODO** en individuos con rasgos catatónicos o depresivos marcados.



## **Bibliografía**

Sadock, B., Ahmad, S., & Sadock, V. (2018). Trastorno esquizofreniforme. En K. & Sadock, *Manual de bolsillo de psiquiatría clínica* (págs. 180 - 181). Barcelona (España): Wolters Kluwer.