



Carlos Alberto Hernández Meza

**DR. Cristian Jonatan Aguilar
Ocampo**

Psiquiatría

PASIÓN POR EDUCAR


Grado: 5

Grupo: B



TRANSTORNOS DEL ESTADO DEL ANIMO

se caracterizan por depresión, tristeza, irritabilidad, retraso psicomotor y, en los casos graves, ideación suicida. Incluyen diversas enfermedades que se describen a continuación.



TRANSTORNO DEPRESIVO MAYOR

- ✓ estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer por las actividades habituales.

Todos los síntomas deben estar presentes prácticamente cada día, excepto las ideas de suicidio o los pensamientos de muerte, que sólo deben ser recurrentes.

El diagnóstico se descarta si los síntomas son consecuencia de un duelo normal y si existen síntomas psicóticos en ausencia de síntomas del estado de ánimo.

TRANSTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE O DISTIMIA.

- ✓ forma de depresión leve y crónica que se prolonga por lo menos durante 2 años.

A lo largo de este periodo, el individuo experimenta un estado de ánimo deprimido casi las 24 h del día y al menos dos síntomas más de depresión.

TRANSTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL

- ✓ Aparece aproximadamente 1 semana antes de la menstruación y se caracteriza por irritabilidad, labilidad emocional, cefalea y ansiedad o depresión, que remiten cuándo acaba el ciclo menstrual.


TRANSTORNO DEPRESIVO INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS.

- ✓ Se caracteriza por un estado de ánimo deprimido debido al consumo de alguna sustancia



TRANSTORNO DEPRESIVO DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA.

- ✓ Es un estado secundario a una enfermedad ejemplo hipotiroidismo o SX de Cushing



TRANSTORNO DE DESREGULACIÓN DESTRUCTIVA DEL ESTADO DE ANIMO.

- ✓ Se trata de un nuevo diagnóstico entre los trastornos depresivos que se presenta en niños mayores de 6 años de edad y menores de 18 años, y se caracteriza por accesos de cólera intensos, irritabilidad crónica y estado de ánimo irascible.

TRANSTORNO DEPRESIVO NO ESPECIFICADO.

- ✓ diagnóstica se compone de cuatro subtipos básicos:
 - 1-melancolía, una forma grave de depresión mayor que se caracteriza por desesperanza, anhedonia y retraso psicomotor, e incluye también un alto riesgo de suicidio:
 - 2-depresión atípica, marcada por un trastorno de ánimo deprimido asociado con ganancia de peso en lugar de pérdida, y con hipersomnía en lugar de insomnio:

3-con inicio en el periparto, en el que la depresión tiene lugar en el periodo del parto o en el mes siguiente de dar a luz

4-con patrón estacional, en el que el estado de ánimo deprimido aparece en un periodo determinado del año, por lo general en el invierno (también conocido como trastorno afectivo estacional).

