



Axel Adnert Leon Lopez

Dra. cristian jonathan aguilar ocampo

infografia de trastornos del estado de animo

psiquiatria

5°

"B"

Comitán de Domínguez Chiapas 10/09/ 2024



trastornos del estado de animo

trastorno del estado mayor

hay retraso psicomotor o agitación. se puede presentar alucinaciones y delirios congruentes con el estado de animo. edad promedio 40 años

cambios en el apetito y el peso, en el sueño y la actividad, falta de energía, sentimientos de culpa, problemas para pensar y tomar decisiones, y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.

debe durar al menos 2 semanas, y la persona con este diagnóstico generalmente experimenta al menos cuatro síntomas



mania

es un episodio diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable,

dura al menos 1 semana o menos si el paciente debe ser hospitalizado,

se asocian al aumento exagerado de la autoestima, disminución de la necesidad de sueño, facilidad para distraerse, gran actividad física y mental, e implicación excesiva en comportamientos placenteros



Distimia y ciclotimia

El trastorno distímico se caracteriza por al menos 2 años de estado de ánimo deprimido. inicia entre los 20 y 35 años de edad. los síntomas deben ser al menos 2 de los siguientes: falta de apetito, ingesta excesiva, problemas de sueño, fatiga, baja autoestima, concentración deficiente o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza

El trastorno ciclotímico se caracteriza por al menos 2 años de síntomas de hipomanía que aparecen con frecuencia, pero que no se ajustan al diagnóstico de episodio de manía, y de síntomas depresivos que no cumplen el diagnóstico de episodio depresivo mayor.



trastorno de desregulación

los síntomas pertinentes incluyen arrebatos de ira agudos y recurrentes, incompatibles con la edad de desarrollo, que se manifiesta con irritabilidad, ira y se producen con una frecuencia de 3 o mas veces a la semana. el diagnostico no debe hacerse antes de los 6 años o despues de los 18 años. .



trastorno de bipolaridad 1

Trastorno bipolar I, episodio maníaco único: los pacientes deben tener su primer episodio de manía para cumplir los criterios diagnósticos del trastorno bipolar I, episodio maníaco único

Los episodios de manía se consideran diferenciados cuando están separados al menos por un período de 2 meses sin síntomas significativos de manía o hipomanía.



trastorno bipolar II

Además de las especificaciones de gravedad, psicoticismo y remisión, pueden utilizarse otros síntomas para describir a los pacientes que presentan varios trastornos del estado de ánimo.

criterios diagnósticos del trastorno bipolar II especifican la gravedad, la frecuencia y la duración de los síntomas de hipomanía en particular

Con características psicóticas. La presencia de características psicóticas en el trastorno de depresión mayor refleja una enfermedad grave y es un indicador de mal pronóstico



Un estado de ánimo deprimido y la pérdida de interés o placer son los síntomas clave de la depresión. Los pacientes pueden decir que se sienten tristes, sin esperanza

Los pacientes a menudo describen el síntoma de la depresión como un dolor emocional angustiante y se quejan porque son incapaces de llorar, un síntoma que se resuelve a medida que mejoran

depresion



bibliografia

**Akiskal HS. Mood disorders:
Clinical features. En: Sadock BJ,
Sadock VA, Ruiz P, eds. Kaplan &
Sadock's Comprehensive Textbook
of Psychiatry. 9. a ed. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins;
2009:1693.**