



Emmanuel Hernández Domínguez

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Infografía

Psiquiatría

5-B

PASIÓN POR EDUCAR

TRANSTORNOS DEPRESIVOS

TRANSTORNO DEPRESIVO MAYOR

- Estado de ánimo deprimido y pérdida de interés por actividades habituales.
- Síntomas presentes todos los días sin ideas de suicidio.



TRANSTORNO DEPRESIVO PERSISTENTE O DISTIMIA

- Depresión leve y crónica que se prolonga por lo menos 2 años.
- Presentan estado de ánimo deprimido las 24 hrs y al menos dos síntomas más de depresión.



TRANSTORNOS DEPRESIVOS ESPECIFICADOS

Existen dos subtipos:


- Episodio depresivo recurrente
 - 2-13 días por lo menos 1 vez al mes
- Episodio depresivo de corta duración
 - 4-14 días sin recurrencias



TRANSTORNO DEPRESIVO NO ESPECIFICADO

Existen 4 subtipos:

- Melancolía
- Depresión atípica
- Con inicio en el periparto
- Con patrón estacional



OTROS TRANSTORNOS

- Trastorno disfórico premenstrual
- Trastorno depresivo inducido por sustancias/medicamento
- Trastorno depresivo debido a otra afección médica.
- Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo.



Sadock, Benjamin J, et al. *Kaplan & Sadock, Manual de Bolsillo de Psiquiatría Clínica*. L'hospitalet De Llobregat, Wolters Kluwer, 2019.