

Nombre del alumno: Yereni Monserrat Pérez Nuricumbo

Nombre del profesor: Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Nombre del trabajo: Infografía de Clasificación Del Dsm-V

Materia: Medicina del Trabajo

Grado: Quinto

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de septiembre de 2024


TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO

Se caracterizan por depresión tristeza, irritabilidad, retraso psicomotor y, en los casos graves, ideación suicida.

Trastorno depresivo mayor




- ☺ **Característica:** pérdida de interés por actividades habituales. Todos los síntomas deben estar cada día, excepto ideas suicidas (deberán ser recurrentes).
- ☺ **Descartar:** si los síntomas son por duelo normal y si existen síntomas psicóticos en ausencia de síntomas del E. Animo.



Trastorno depresivo debido a otra afección médica

Estado secundario a una enfermedad (ej., hipotiroidismo o síndrome de Cushing).



Otro trastorno depresivo especificado 2 subtipos

Depresivo recurrente → E. depresivo al menos 2-13 días, aparece al menos 1 vez al mes.

Depresivo-corta duración: E. deprimido se prolonga entre 4 y 14 días. -No hay recurrencias.



Trastorno depresivo persistente o distimia

Depresión leve y crónica, se prolonga por lo menos durante 2 años. Se experimenta un estado de ánimo deprimido casi 24 h del día y al menos 2 síntomas + de depresión.



Otros trastorno depresivo no especificado

Melancolía: 4 Subtipos
Forma grave de depresión mayor
Caracteriza: desesperanza, anhedonia retraso psicomotor.
Alto riesgo de suicidio

Depresión atípica,
T. ánimo deprimido asocia con ganancia de peso en lugar de pérdida.
Hipersomnía en lugar de insomnio.

Inicio en periparto
Depresión en período del parto o mes siguiente de dar a luz.
DSM-IV-- >depresión posparto



Trastorno disfórico premenstrual.

Aparece 1 semana antes de la menstruación.

Caracteriza: irritabilidad, labilidad emocional, cefalea y ansiedad o depresión, remiten al final del ciclo menstrual.



Patrón estacional/ trastorno afectivo estacional
E. Animo deprimido aparece-> período determinado del año general en invierno c

Trastorno depresivo inducido por sustancias/medicamentos

Se caracteriza x un estado de ánimo deprimido por consumo de alguna sustancia (alcohol, medicamento barbitúrico).



Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo.

nuevo diagnóstico
Se presenta: niños > 6 años y -18 años.
Caracteriza: accesos de cólera intensos, irritabilidad crónica y estado de ánimo irascible.



Bibliografía

Benjamin J. Sadock, M.D; Samoon Ahmad, M.D; Virginia A. Sadock, M.D. (2018). *KAPLAN Y SADOCK, Manual de bolsillo de psiquiatría clínica* . Barcelona (España): Wolters Kluwer .